

BOLETÍN EPIDEMIOLOGICO SEMANAL

Fecha: Lunes 5 de Mayo - Asunción, Paraguay
 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL-MSPBS
 DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD-DGVS

Boletín Nº 17 Año 6
 Semana Epidemiológica Nº 17
 20/ al 26 /04/08

LANZAMIENTO DE LA SEMANA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS -28 DE ABRIL AL 5 DE MAYO-

Alrededor de 62 millones de personas serán inmunizadas contra varias enfermedades durante la Semana de Vacunación en las Américas, organizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La campaña se lleva a cabo en 44 países y territorios del hemisferio, y la OPS calcula que no tendrá precedentes, con la ayuda de miles de voluntarios y personal de sanidad.

La iniciativa comenzó en los países andinos hace seis años, y ahora se está extendiendo a Europa, donde piensan vacunar en 33 países, y eventualmente, los oficiales de inmunización de la OPS esperan que sea una iniciativa internacional que abarque todos los países del mundo. Serán vacunadas personas de todas las edades de manera gratuita, pero que se hará hincapié en comunidades indígenas y en los sectores más desprotegidos en localidades remotas, fronterizas y de difícil acceso.

Gracias a esta inmunización masiva se han evitado en los últimos años miles de nuevos casos y muertes por enfermedades como sarampión, rubéola, polio, tétano, difteria, fiebre amarilla, gripe, rotavirus, hepatitis B y tos ferina.

EN PARAGUAY

En nuestro país la actividad se extenderá del 28 de abril al 31 de mayo, con el propósito de disminuir los riesgos de recurrencia de casos de fiebre amarilla y de complicaciones y muertes debidas a influenza en la población de Paraguay. Los objetivos generales son: avanzar en el Plan de control de brote de fiebre amarilla; reducir el riesgo de complicación y muerte por influenza; aumentar el acceso de poblaciones excluidas a la vacunación regular. Los objetivos específicos son: vacunar contra la fiebre amarilla a población de 1 a 59 años residentes en municipios con focos confirmados de FA, en fronteras con Brasil, Argentina y en la franja de distribución vecina a casos confirmados; vacunar contra influenza a niños y niñas de 6 a 23 meses, adultos de 60 y más años y otros grupos de riesgo antes de la estación de invierno; y puesta al día del esquema de vacunación regular en los menores de cinco años para aumentar coberturas de vacunación con todos los biológicos.

LINEAMIENTOS PARA LA SEMANA DE LA VACUNACION EN LAS AMERICAS

Se aplicarán las vacunas:

◆ ANTI INFLUENZA:

- En niños y niñas de más de 6 meses iniciar la primera dosis al contacto y la segunda dosis con intervalos de 4 semanas
- En niños y niñas de 6 a 11 meses: aplicar 2 dosis con intervalo de un mes. Iniciando la primera dosis con las terceras dosis de OPV y Penta en niños de seis meses y programar para cuatro semanas después de la segunda dosis.
- En niños y niñas de 12 a 23 meses: aplicar una sola dosis.
- En personas de 60 años y más, embarazadas a partir del 4º mes, trabajadores de salud, enfermos crónicos, trabajadores avícolas; aplicar una sola dosis.

◆ BCG: Administrar a todo niño o niña menor de 5 años que aún no tenga antecedentes de vacunación de BCG.

◆ VACUNA PENTAVALENTE: Iniciar o completar esquema de vacunación en niños y niñas menores de 5 años según el esquema básico de vacunación (1º, 2º ó 3º dosis, según corresponda).

◆ VACUNA OPV: Iniciar o completar esquema de vacunación en niños y niñas menores de cinco años según el esquema básico de vacunación (1º, 2º, o 3º dosis, según corresponda).

◆ ANTI AMARILICA: vacunar contra la fiebre amarilla a la población de 1 a 59 años residentes en municipios con focos confirmados de FA de frontera con Brasil y Argentina y de franja de distribución biogeográfica vecina de casos confirmados.

◆ DPT Y OPV: Iniciar o completar los refuerzos del esquema de vacunación en los niños y niñas al año de la tercera dosis del esquema básico y a los cuatro años cumplidos, cuidando siempre que exista un intervalo mínimo de un año entre el primero y el segundo refuerzo.

◆ La DPT solo se utiliza para los refuerzos; no utilizar DPT para iniciar esquemas de vacunación en menores de 5 años (hasta 4 años, 11 meses y 29 días).

◆ SPR: a niños y niñas de uno a cuatro años sin antecedentes de vacunación con SPR y a niños y niñas de 4 años con la primera dosis pero sin el refuerzo de SPR.

- ◆ **SR:** se utiliza como refuerzo a niños y niñas mayores de 4 años con antecedente de una dosis de SPR.
- ◆ **TD:** Iniciar o completar esquemas, se aplica en la campaña conjuntamente con anti influenza a embarazadas y a personas de 60 años y más para ganar la oportunidad de vacunación, a la vez de disminuir los riesgos de difteria y tétanos

Tabla 1. Esquema de vacunación y dosis para la anti-influenza

Edad	Dosis	Nº De Dosis	Intervalo Mínimo
6 A 11 Meses	0,25 ml	2 dosis	4 semanas
12 A 23 Meses	0,25 ml	1 dosis	
* A 3 Años	0,25 ml	1 dosis	
* 3 A 59 Años	0,5 ml	1 dosis	
60 Años Y Más	0,5 ml	1 dosis	
Embarazadas A Partir Del 4º Mes	0,5 ml	1 dosis	

* Considerar criterios de riesgo

Fuente: Programa Nacional de Enfermedades inmunoprevenibles y PAI

DENGUE EN PARAGUAY

Hasta el 5 de mayo, fueron confirmados 10 pacientes con dengue, de los cuales, el 80 % es del sexo femenino, con una media de 28.5 años, el 30% corresponde a casos en el departamento Central, (Tabla 2)

Tabla 2. Características de los pacientes confirmados
N: 10

PACIENTE	EDAD	SEXO	PROCEDENCIA
1	41	M	Presidente Franco
2	11	F	Capiatá
3	8	F	Pedro Juan Caballero (PJC)
4	20	F	Caacupé
5	11	F	Villa Elisa
6	69	F	PJC
7	17	F	PJC
8	39	M	Lambaré
9	22	F	J. Augusto Saldívar
10	47	F	PJC

Fuente : Centro de cómputos (DIVET), registro de resultados (LCSP)

SITUACION ACTUAL DEL BROTE DE FIEBRE AMARILLA(FA)

En las últimas 7 semanas no se han confirmado nuevos casos de FA. El total de confirmados permanece en 26 casos, con una tasa de letalidad de 31% (8/26). El último caso se registró el 4 de marzo de 2008.

Fuente: Sala de situación FA

Dr. GUALBERTO PIÑÁNEZ, Director DGVS
Comité Editorial
DRA. MALVINA PAEZ, Coordinadora
DR. FLORIANO CALDEROLI, Asesor DGVS
DRA. MARÍA ANGÉLICA LEGUIZAMÓN SAMANIEGO

Dirección General de Vigilancia de la Salud
Manuel Domínguez e/ Brasil y Rojas Silva.
Edificio del SENEPA 1er Piso.
Telefax: 203 998/208 217
Correo Electrónico: dgvspy@gmail.com,