



BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

Fecha: Lunes 14 de Enero - Asunción, Paraguay
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL-MSPBS
DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD-DGVS

Boletín N° 1 Año 6
Semana Epidemiológica N° 1
30/ 12/07 al 5/1/08

CIRCULAR DGVS

DE LA DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD, A LOS DIRECTORES/AS DE REGIONES SANITARIAS Y SERVICIOS DE SALUD (HOSPITALES, CENTROS DE SALUD Y PUESTOS DE SALUD) DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

Frente al riesgo de reurbanización de la Fiebre amarilla en las Américas, por la amplia diseminación del vector, el mosquito *Aedes aegypti* y el Plan de Vacunación existente, se establecen:

- 1) Extender el Plan de Vacunación contra la Fiebre Amarilla, a todas las regiones sanitarias del país.
- 2) Aplicar una dosis de vacuna antiamarílica a toda la población, a partir de los 1 año de edad.
- 3) Mantener la vacunación antiamarílica a todo viajero a zonas endémicas, por lo menos 10 días antes del viaje.
- 4) La vigilancia epidemiológica de la Fiebre Amarilla, debe ser fortalecida utilizando el enfoque de vigilancia del síndrome febril icterico (presencia de fiebre y manifestaciones de ictericia con o sin sangrado) especialmente, en las regiones fronterizas con Bolivia y Brasil.

Dr.Gualberto Piñáñez Benítez
Director General
Dirección General de Vigilancia de la Salud

FIEBRE AMARILLA

Es una enfermedad febril aguda, causada por el virus de la Fiebre Amarilla (FA).

Transmisión: vectorial, a través de mosquitos del género *Haemagogus* y *Aedes*.

Clasificación: en dos formas, la selvática y la urbana, que depende del mosquito transmisor.

La FA selvática es transmitida por un mosquito propio de la selva del género *Haemagogus*.

La FA urbana es transmitida por el mosquito *Aedes aegypti*, el mismo transmisor del dengue.

Expansión Geográfica en América:

La FA urbana se erradicó en América hace más de 70 años, gracias a la casi erradicación del mosquito *Aedes aegypti*, en esa época. Actualmente existe, solamente, la forma selvática en toda la Región Amazónica que abarca el Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y las Guayanas.

Prevención y control: existe vacuna de alta eficacia. Se aplica desde los 1 año de edad a todas las edades.

En nuestro país se está aplicando esta vacuna desde los años 2000, por etapas, priorizando las zonas de riesgo fronterizas con Brasil y Bolivia, así como los que viajan a zonas endémicas como mínimo 10 días antes del viaje.

Actualmente la vacunación está destinada a toda la población y está incluida en el Programa Regular del PAI, para los niños de 1 año de edad.

El Paraguay no es área endémica de FA. Los últimos casos de FA selvática importado del Brasil, se presentaron hace más de 40 años en el departamento de Amambay.

Manifestaciones Clínicas

Las manifestaciones principales son la fiebre, ictericia y hemorragias, la que se describe en las formas graves de la enfermedad.

Actualmente se conoce gracias a estudios de investigación, que la gran mayoría de los casos son leves e inclusive subclínicos. Las formas leves se caracterizan por fiebre, dolores de cuerpo, decaimiento, similar al dengue benigno.

Letalidad

La letalidad es alta en las formas graves, entre 50-60 %.

Situación epidemiológica:

Desde noviembre y diciembre de 2007, se está produciendo un brote importante de FA en monos (epizootia), principalmente en Goiás, Minas Gerais y Distrito Federal, en la Región oeste del Brasil.

Se están investigando más de 6 casos humanos, con 2 casos fatales.

El Ministerio de Salud del Brasil está vacunando masivamente en estas zonas, como los que viajan a las zonas de riesgo.

La costa Atlántica del Brasil, Río de Janeiro, San Pablo, Santa Catarina, no es zona de riesgo.

RECOMENDACIONES

Vacunarse por lo menos 10 días antes, a los viajeros a zonas endémicas o de riesgo del Brasil, e inclusive es mejor vacunarse aunque inicialmente tengan previsto viajar a regiones libres de la enfermedad.

El MSP y BS dispone una reserva de 250 000 dosis de vacuna para FA además de estar distribuidas en casi todas las regiones sanitarias.

Para los viajeros, sugerimos concurrir al local de vacunación de la 18ª Región Sanitaria, en el Edificio de Brasil entre FR Moreno y Manuel Domínguez.

CONTRAINDICACIONES

- NIÑOS MENORES DE 6 MESES
- PERSONAS CON VIH/SIDA
- PACIENTES CON TRATAMIENTO INMUNOSUPRESORES
- EMBARAZADAS, DURANTE TODO EL PERIODO DEL EMBARAZO (con alguna excepción, en situaciones especiales de riesgo de exposición al virus de la FA)

Dr. GUALBERTO PIÑÁNEZ, Director DGVS
Comité Editorial
 Dra. MALVINA PAEZ, Coordinadora
 Dr. FLORIANO CALDEROLI, Asesor DGVS
 Dra. MARÍA ANGÉLICA LEGUIZAMÓN SAMANIEGO

Dirección General de Vigilancia de la Salud
 Manuel Domínguez e/ Brasil y Rojas Silva.
 Edificio del SENEPA 1er Piso.
 Telefax: 203 998/208 217
 Correo Electrónico: davs_pv@yahoo.com,
gie@mspbs.gov.py