

Este boletín presenta la información actualizada de la Situación de Arbovirosis: Dengue, Zika y Chikungunya, en el departamento de Misiones.

Los datos presentados, tienen, como fuente principal, la base de datos del Sistema de Información de la Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad de Datos (VENOCD).

La revisión y difusión de las informaciones, aquí presentadas, son realizadas por el Equipo técnico de Alerta y Respuesta ante Emergencias en Salud Pública-Centro Nacional de Enlace (CNE).

Situación Epidemiológica de Arbovirosis

Actualización desde la SE 1 a la SE 41
(30/12/2018 al 12/10/2019)

Misiones.

Contenido

| | |
|---|----|
| Índice de infestación larvaria..... | 3 |
| Definición técnica..... | 3 |
| Descripción del Método LIRAA..... | 3 |
| Referencia según la escala de infestación..... | 3 |
| Criaderos..... | 4 |
| Definición técnica..... | 4 |
| Situación Epidemiológica - Misiones..... | 5 |
| Grafico de notificaciones de Arbovirosis..... | 6 |
| Curva de notificaciones de Arbovirosis..... | 7 |
| Gráfico de confirmados y probables según edad y sexo..... | 7 |
| Curva de comparación. (2014 al 2019)..... | 8 |
| Consideraciones finales..... | 9 |
| Contacto | 10 |

Índice de infestación larvaria.

Definición técnica.

Se define al índice de infestación larvaria por el cálculo porcentual de viviendas donde excede el 1% de cantidad de criaderos positivos del *Aedes aegypti*¹.

Este cálculo realizado por el equipo técnico del SENEPA permite la aplicación de una escala de riesgo, que representa el riesgo de brote epidémico de Dengue, Zika y Chikungunya.

Descripción del Método LIRAA.

Es un método que se utiliza para el "Levantamiento de índice rápido de *Aedes aegypti*" (LIRAA) realizado por el personal de SENEPA. Este método permite identificar en un plazo corto de tiempo los niveles de infestación del mosquito transmisor de las Arbovirosis.

Referencia según la escala de infestación.

La escala de riesgo es una variable operacional de tipo cualitativa, dividida en tres categorías: "satisfactorio", "alerta" y "riesgo". Las categorías están relacionadas con el porcentaje del índice de infestación larvaria.

Los valores para la variable de escala de riesgo son los siguientes: "satisfactorio" (menor a 0.9%), "alerta" (1% a 3.9%) y "riesgo" (igual o mayor a 4%).

Tabla 1. Escala de Riesgo según el índice de infestación.

| Escala de Riesgo | | |
|------------------|-----------|--------------------|
| Satisfactorio | Alerta | Riesgo |
| menor a 0.9% | 1% a 3.9% | igual o mayor a 4% |

Tabla 2. INDICE DE INFESTACIÓN METODO LIRAA- 2019

| DEPARTAMENTO | DISTRITO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO |
|--------------|-------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|
| MISIONES | AYOLAS | | 2,05 | | | | 4,66 | |
| | SAN JUAN BAUTISTA | | 2,86 | | | | 2,86 | |
| | SAN IGNACIO | | 6,63 | | | | 8,71 | |

¹ Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Paraguay (SENEPA).

Criaderos.

Definición técnica.

Se entiende por criadero a cualquier recipiente que contenga agua estacionada. Se resumen los tipos de criaderos por grupos en la tabla 3.

Una clasificación de criadero permite identificar todo posible elemento donde se colecta agua y, enfatizar en la eliminación de los mismos a través de su identificación. En la tabla se presenta una clasificación de criaderos según el tipo de depósito y los elementos que pertenecen a dicha clasificación.

Tabla 3. Clasificación de criaderos según el tipo de depósitos utilizados en el Método LIRAA².


| Clasificación de criaderos según el tipo de depósito utilizado. | |
|---|---|
| Grupo de Criadero | Tipos de recipientes |
| Depósitos para almacenamientos de agua para consumo humano | Tanques elevados. |
| Depósitos móviles | Tambor, balde, cántaro, pozos, aljibes, estanques. |
| Depósitos fijos | Registros, canaletas, piscinas, piletas, botellas rotas colocadas en las murallas. |
| Neumáticos usados | Neumáticos de todo tipo de vehículo o móvil. |
| Desechos sólidos inservibles | Recipientes plásticos, botellas, latas, electrodomésticos inservibles o en desuso dejados en la intemperie. |
| Criaderos naturales | Espacios huecos de árboles y arbustos. Espacios huecos entre las piedras. |

² Adaptado de la información de SENEPA: “Tipos de criaderos por grupos”.

Situación Epidemiológica de la VIII Región Sanitaria-Misiones

En el departamento de Misiones, desde la SE 1 a la SE 41, se acumulan 47 notificaciones de casos sospechosos de Arbovirosis en el sistema de vigilancia. En los datos acumulados distribuidos según distrito, se observa que Santa María es el distrito que cuenta con mayor número de notificaciones n= 14, **29%**, (14/47).

Gráfico 1. Número de Notificaciones de Misiones, año 2019.



Situación local de Arbovirosis.

Tabla 4. Notificaciones de Vigilancia Arbovirosis desde la SE 1 a la SE 41 del Departamento de Misiones, año 2019.

En la tabla se resumen las notificaciones de Vigilancia de Arbovirosis acumuladas desde la SE 1 a la SE 41 del Departamento de Misiones.

En la columna “DENGUE”, “CHIKUNGUNYA” y “ZIKA”, no se observan casos confirmados. Se han registrado dos casos notificados como probables.

En la columna “NOTIFICACIONES” se detallan los casos sospechosos y descartados para la vigilancia de Arbovirosis. Dentro del sistema de vigilancia que corresponde a la región de Misiones, se reportan n= 47 notificaciones de casos sospechosos.

En la siguiente columna de notificaciones, los casos descartados corresponden a n= 23 desde la SE 1 a la SE 41.

Finalmente, el número total de reportes de casos probables y sospechosos de Dengue corresponde a n= 49, desde el inicio de las notificaciones de la SE 1 a la SE 41.

| NOTIFICACIONES Y CASOS DE ARBOVIROSIS-DEPARTAMENTO DE MISIONES-AÑO 2019 | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|--|
| Ditritos del departamento Misiones | DENGUE | | CHIKUNGUNYA | | ZIKA | | NOTIFICACIONES | | Total de conf. probables y sospechosos |
| | Confirmados | Probables | Confirmados | Probables | Confirmados | Probables | Sospechosos | Descartados | |
| SAN JUAN BAUTISTA | | 1 | | | | | 8 | 3 | 9 |
| SAN IGNACIO | | | | | | | 13 | 1 | 13 |
| SANTA ROSA | | | | | | | 5 | 11 | 5 |
| AYOLAS | | 1 | | | | | 1 | 2 | 2 |
| VILLA FLORIDA | | | | | | | 2 | 1 | 2 |
| SANTIAGO | | | | | | | 2 | 2 | 2 |
| SAN PATRICIO | | | | | | | 1 | | 1 |
| SANTA MARIA | | | | | | | 14 | 3 | 14 |
| SAN MIGUEL | | | | | | | | | |
| YABEBYRY | | | | | | | 1 | | 1 |
| TOTALES | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 23 | 49 |

Gráfico 2. Curva de notificaciones desde la SE 1 a la SE 41 de Arbovirosis en la VIII Región Sanitaria, Misiones, año 2019.

Este gráfico presenta el número de notificaciones de pacientes que iniciaron síntomas en determinada semana epidemiológica.

Se presenta en el eje de abscisas las semanas epidemiológicas desde la SE 1 a SE 41 y, en el eje de ordenadas el número de casos. Se observa una distribución asimétrica de notificaciones según semanas epidemiológicas. Los picos máximos se pueden observar en las semanas: SE 11, SE 12 y SE 19. Luego, se aprecia un corte de circulación desde la SE 22 a la SE 35. Previamente a la SE actual se han notificado dos casos en las SE 36 y SE 38.





Gráfico 3. Curva comparativa de las notificaciones del Departamento de Misiones, desde la SE 1 a la SE 41, de Arbovirosis en la VIII Región Sanitaria desde el año 2014 al año 2019.

En el comparativo de las notificaciones de casos por semana epidemiológica se aprecia que el mayor número de notificaciones se registró en el año **2016 en la SE 10** y, en el año **2018 en la SE 11**. Actualmente las notificaciones se encuentran dentro de lo esperado.



Consideraciones finales

El contenido de este boletín puede modificarse según la dinámica de la vigilancia de las Arbovirosis. Las notificaciones de Arbovirosis se definen operacionalmente, en este boletín, a partir de la Resolución N° 60 “Protocolo de Vigilancia de la Salud Integrada de Enfermedades Transmitidas por Vectores- Criterios de Definición de Casos y Flujograma de Caso Febril” del año 2016. Remitirse a este documento oficial para conocer las definiciones epidemiológicas de caso utilizados en este material.

En lo que respecta a los resultados de notificaciones presentados, la revisión y calidad del dato se realizan en el Departamento de Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato (VENOC). Seguida de una revisión para difusión por el Equipo técnico de la Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública-R.S.I, dependiente de la Dirección de Vigilancia de Salud (DGVS) del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS).

Con relación al gráfico 3 Según el MOPECE (2° edición, 2011)³, la distribución de los casos en el tiempo permite el establecimiento de hipótesis acerca del comportamiento de una enfermedad. Además, el patrón de variación (regular o no) o comportamiento general por largos periodos de tiempo (corresponde a un tipo de tendencia secular).

³ Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud. (2011). *Módulo de Principios de Epidemiología para el control de Enfermedades (MOPECE)*. Recuperado de:

https://www.paho.org/col/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=publicaciones-ops-oms-colombia&alias=856-mopec4&Itemid=688

Contactos

1. Oficina Regional de la VIII Región Sanitaria-Unidad Epidemiológica Regional-Misiones

Telefax: 0721 212354

Correo electrónico: uer.misiones@gmail.com

2. Departamento de Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato (VENOC).

Teléfono: (021)-208-217

Correo electrónico: venocd.dgvs@gmail.com

3. Equipo técnico de la Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública-R.S.I.

Teléfono: (021)-222-012

Correo electrónico: dgvs.sala@gmail.com

4. SENEPA-Zona 8-Misiones.

Correo electrónico: zona8misiones_@hotmail.com