

Descripción

Este boletín contiene información

actualizada de la Situación de Arbovirosis: Dengue, Zika y Chikungunya.

Los datos presentados, tienen como fuente principal la base nacional de febriles. Los registros de cada Región Sanitaria son consolidados en la Sección de Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad de Datos (VENOCD).

La revisión final y difusión de las informaciones, aquí presentadas, son realizadas por el equipo técnico de la Dirección de Alerta y Respuesta ante Emergencias en Salud Pública /Centro Nacional de Enlace (CNE).

Situación Epidemiológica de Arbovirosis

Actualización desde la SE 1 a la SE 48
(30/12/2018 al 30 /11/2019)

Central

Elaboración:

Equipo técnico de la
Unidad Epidemiológica
Regional.

Contenido

Índice de infestación larvaria.

Definición técnica. 3

Descripción del Método LIRAA.

Referencia según la escala de infestación. 3

Criaderos.

Definición técnica 5

Situación Epidemiológica en el departamento Central

Resumen de ésta edición 6

Situación departamental de Arbovirosis. 7-10

Circulación viral departamental 11

Situación Epidemiológica en los distritos del departamento

San Lorenzo 12

Capiatá 13

Mariano Roque Alonso 14

Consideraciones finales. 15

Contactos 16

Índice de infestación larvaria.

Definición técnica.

Se define al índice de infestación larvaria por el cálculo porcentual de viviendas donde excede el 1% de cantidad de criaderos positivos del *Aedes aegypti*¹.

Este cálculo realizado por el equipo técnico del SENEPA permite la aplicación de una escala de riesgo, que representa el riesgo de brote epidémico de Dengue, Zika y Chikungunya.

Descripción del Método LIRAA.

Es un método que se utiliza para el "Levantamiento de índice rápido de *Aedes aegypti*" (LIRAA) realizado por el personal de SENEPA. Este método permite identificar en un plazo corto de tiempo los niveles de infestación del mosquito transmisor de las Arbovirosis.

Referencia según la escala de infestación.

La escala de riesgo es una variable operacional de tipo cualitativa, dividida en tres categorías: "satisfactorio", "alerta" y "riesgo". Las categorías están relacionadas con el porcentaje del índice de infestación larvaria. Los valores para la variable de escala de riesgo son los siguientes: "satisfactorio" (menor a 0.9%), "alerta" (1% a 3.9%) y "riesgo" (igual o mayor a 4%).

Tabla 1. Escala de Riesgo según el índice de infestación.

Escala de Riesgo		
Satisfactorio	Alerta	Riesgo
menor a 0.9%	1% a 3.9%	igual o mayor a 4%

[Ir a contenido](#)

¹ Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Paraguay (SENEPA).

Tabla 2. Índice de infestación método (LIRAa), Central. Año 2019.

DISTRITOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
FERNANDO DE LA MORA	12,07		12,15				4,08	
ITÁ		18,86						
AREGUA		17,50						
ITAUGUÁ		9,38						
LAMBARÉ				20,11			4,25	
LIMPIO		11,29						
LUQUE	19,95							
MARIANO R ALONSO				13,25			5,47	
ÑEMBY		12,98						
SAN ANTONIO		11,50						
SAN LORENZO	14,30							
CAPIATA	8,67							
J.A. SALDIVAR		8,03						
GUARAMBARE		9,00						
YPANE		14,77						
NUEVA ITALIA		16,25						
VILLA ELISA			13,88					
YPACARAI			11,45					
VILLETA			12,50					

[Ir a contenido](#)

Criaderos

Definición técnica.

Se entiende por criadero a cualquier recipiente que contenga agua estacionada. Se resumen los tipos de criaderos por grupos en la tabla 3.

Una clasificación de criadero permite identificar todo posible elemento donde se colecta agua y, enfatizar en la eliminación de los mismos a través de su identificación. En la tabla se presenta una clasificación de criaderos según el tipo de depósito y los elementos que pertenecen a dicha clasificación.

Tabla 3. Clasificación de criaderos según el tipo de depósitos utilizados en el Método LIRAA².

Clasificación de criaderos según el tipo de depósito utilizado.	
Grupo de Criadero	Tipos de recipientes
Depósitos para almacenamientos de agua para consumo humano	Tanques elevados.
Depósitos móviles	Tambor, balde, cántaro, pozos, aljibes, estanques.
Depósitos fijos	Registros, canaletas, piscinas, piletas, botellas rotas colocadas en las murallas.
Neumáticos usados	Neumáticos de todo tipo de vehículo o móvil.
Desechos sólidos inservibles	Recipientes plásticos, botellas, latas, electrodomésticos inservibles o en desuso dejados en la intemperie.
Criaderos naturales	Espacios huecos de árboles y arbustos. Espacios huecos entre las piedras.

[Ir a contenido](#)

² Adaptado de la información de SENEP: “Tipos de criaderos por grupos”.

Resumen de esta edición

- > En el departamento se registra un promedio **de 299 notificaciones de Arbovirosis** en las últimas 3 semanas (SE 46, 47 y 48). (Gráfico 2)
- > Desde mediados de octubre se observa un aumento paulatino de las notificaciones de sospechas de arbovirosis, superando las últimas semanas las 330 notificaciones en una semana. (SE 46 y SE 47)
- > Los aumentos de notificaciones se observan principalmente en los distritos de Lambaré, Mariano Roque Alonso, Luque y San Lorenzo en las últimas 3 semanas. (Gráfico 3)
- > **Brotos activos de dengue en:**
Lambaré: B° Valle Yvaté y Santo Domingo
Mariano Roque Alonso: B° Central
- > **Se registran casos de dengue en 6 distritos del departamento con fecha de inicio de síntomas entre las SE 46, 47 y 48 y son:**
 - > Lambaré
 - > Mariano Roque Alonso
 - > Luque
 - > San Lorenzo
 - > Fernando de la Mora
 - > J. A Saldivar

Chikungunya y Zika: no se registran casos nuevos en esta semana (confirmados ni probables)


Situación Epidemiológica de la XI Región Sanitaria-Central

DATOS DE LAS ÚLTIMAS SEMANAS. Situación departamental de Arbovirosis.

Las notificaciones se registran en los 19 distritos del departamento. En las últimas 3 se semanas con un total de **896 notificaciones**.


Gráfico 3. Notificaciones de Arbovirosis por distritos del Departamento de Central. Año 2019.

Notificaciones de Dengue, Chikungunya y Zika, según distrito de procedencia.
SE 46 a la SE 48 2019. Departamento Central



Distritos

Mapa 2



En el mapa 2 se observa que San Lorenzo, Capiatá y Lambaré, Fernando de la Mora presentan más de 100 notificaciones entre las **SE 45 a la 48**.

De 50 a 100 notificaciones se registran en Itá y Luque.

[Ir a contenido](#)

DATOS ACUMULADOS. Situación departamental de Arbovirosis.

En el departamento de Central, desde el SE 1 al SE 48, se acumulan **8.919 notificaciones** (confirmados, probables y sospechosos) de Arbovirosis en el sistema de vigilancia. El departamento de Central cuenta con **19 distritos**, todos registran notificaciones. En los datos acumulados distribuidos según distrito, se observa que corresponden al mayor número de notificaciones los siguientes: San Lorenzo **18,64%** (1.663/8.919), Capiatá **17,05%** (1.521/8.919), Mariano R. Alonso **11,65%** (1.036/8.919), Luque **1,03%** (806/8.919), Lambaré **1,24%** (735/8.919) y Fernando de la Mora **1,47%** (667/8.919). Los distritos restantes cuentan con **menos de 500 notificaciones acumuladas**.

Gráfico 1. Número de notificaciones, departamento de Central. Año 2019.




Tabla 4. Notificaciones de Vigilancia Arbovirosis desde la SE 1 a la SE 48 del Departamento de Central, año 2019

Distritos del departamento Central	DENGUE		CHIKUNGUNYA		ZIKA		NOTIFICACIONES		Total de conf. probables y sospechosos
	Confirmados	Probables	Confirmados	Probables	Confirmados	Probables	Sospechosos	Descartados	
SAN LORENZO	31	371		1			1.260	554	1.663
CAPIATA	17	424		2			1.078	312	1.521
MARIANO ROQUE ALONSO	12	442					582	277	1.036
LUQUE	23	187		2			594	510	806
LAMBARE	17	151		1			566	141	735
FERNANDO DE LA MORA	16	312		3			336	416	667
ÑEMBY	19	105					262	143	386
LIMPIO	5	32		1			338	127	376
VILLA ELISA	10	70					224	171	304
ITAUGUA	2	7		1			281	96	291
ITA	1	6					244	159	251
YPANE	2	19					189	64	210
JOSÉ AUGUSTO SALDIVAR	6	11					180	46	197
AREGUA	2	20					163	99	185
SAN ANTONIO	10	20		1			99	48	130
YPACARAI							51	18	51
GUARAMBARE		2					44	15	46
VILLETA							46	16	46
NUEVA ITALIA		1					17	12	18
TOTAL	173	2.180	0	12	0	0	6.554	3.224	8.919

[Ir a contenido](#)

En la tabla 4, se observan los siguientes datos:

DENGUE: En el departamento acumula un total de: **2.353 casos de dengue: 173 casos confirmados de dengue que se distribuyen en 15 distritos**, principalmente en San Lorenzo (n=31) , Ñemby (n=19) y Luque (n=23) y se han clasificado **1.984 casos probables**.

CHIKUNGUNYA: se registran **12 casos clasificados como probables** en 7 distritos del departamento: Fernando de la Mora (n=3), Capiatá (n=2), Luque (n=2), San Lorenzo, Limpio, Itauguá, Lambaré y San Antonio con un caso cada uno.

ZIKA: **no** se observan casos confirmados ni probables.

En cuanto a las “**NOTIFICACIONES**” de la vigilancia de Arbovirosis, se acumulan en el departamento un total de **8.919 casos sospechosos**, de los cuales corresponden más de 1.000 sospechoso Al distrito de San Lorenzo, Capiatá y MRA. Se ha **descartado 3.224 casos** que corresponden principalmente al distrito de Luque y San Lorenzo con más de 500 descartados.

En términos porcentuales, el departamento presenta:


26,38 % (2.353/8.919) casos de dengue (confirmados y probables)

1,13 % (12/8.919) caso probable de chikungunya

73,48% (6.554/8.919) sospechosos.


Gráfico 2. Curva de notificaciones de Arbovirosis. Desde la SE 1 a la SE 48. Departamento de Central. Año 2019.

Notificaciones de arbovirosis por semana de inicio de síntomas. XI Región Sanitaria-Central Desde la SE 1 a SE 48. Año 2019.



En la curva de notificaciones se observa el mayor número que se registró en la SE 20 con N=477. Se observa un promedio de **299 notificaciones** en las últimas 3 semanas (SE 46,47 y 48).


Gráfico 4. Casos de Arbovirosis por semana de inicio de síntomas. Departamento de Central. Año 2019.



En la semana (SE 47) se observan **58 casos de dengue** de los cuales: **11 casos fueron confirmados y 47 probables** en los distritos de Mariano Roque Alonso, Lambaré, Fernando de la Mora, Luque y J. A Saldívar identificándose la circulación de los serotipos DEN-2 y DEN-4, con predominio de éste último.

En el SE **40 se registró el último caso probable de chikungunya** en el distrito de San Antonio

Gráfico 5. Casos de dengue por grupo de edad y sexo. Departamento de Central. Año 2019.




De los casos de dengue registrados en el departamento Central fueron afectados todos los grupos de edades de <1 año a 60 y más años de edad, con predominio en el de 20 a 39 años y del sexo femenino.

Gráfico 6. Comparativo de notificaciones de Arbovirosis. SE 1 a SE 52 de los años 2014 al 2018.

SE 1 a la SE 48 del año 2019. Departamento de Central

Comparativo de notificaciones de Arbovirosis. SE 1 a SE 52 de los años 2013 al 2018. SE 1 a la SE 48. Año 2019. Departamento de Central



En el comparativo de las notificaciones de casos por semana epidemiológica se aprecia la tendencia de este año en aumento en las últimas SE 45, 46 y 47, superando al año 2018 en el mismo periodo. [Ir a contenido](#)

Circulación viral en la XI Región Sanitaria- Central

Dengue: en el mapa cartográfico, a escala de 0 a 20 kilómetros, se observa la circulación activa del virus del dengue en 78,94% (15/19) de los distritos, con el predominio de DEN-4 en el departamento. Circulación de sólo el serotipo de DEN-4 en 8 distritos: Itauguá, Itá, Areguá, Villa Elisa, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Capiatá y José Augusto Saldivar


Co- circulación de dengue:

DEN-1 y DEN-4: en el distrito de Luque se identificó un (1) caso con identificación de DEN-1 con antecedentes de viaje a Cuba en la SE 2, el mismo no generó otros casos relacionados, posteriormente en el mencionado distrito se identificó DEN-4.

DEN-2 y DEN-4 en 7 distritos: San Lorenzo, Fernando de La Mora, San Antonio, Lambaré, Limpio , Ypané y MRA.

Chikungunya: se evidencia la circulación de chikungunya en 7 de los distritos del departamento Central. Entre las SE 1 y SE 35 se registraron 11 casos clasificados como probables en: Luque, Capiatá, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Itauguá, Limpio , Lambaré y San Antonio.

Mapa 2. Distribución de serotipos de dengue identificados y caso probable de Chikungunya por distritos. Departamento de Central. Año 2019.



Situación Epidemiológica del distrito de San Lorenzo-XI Región Sanitaria-Central

Desde SE 1 al 48 se registraron un total de **1.663 notificaciones** (*confirmados, probables y sospechosos*) de Arbovirosis (*dengue, chikungunya y zika*) en el distrito de San Lorenzo.

Datos acumulados.

Total de casos de dengue: 402 casos de dengue: de los cuales se registraron **31 confirmados** en los barrios: Barcequillo (4), Villa del Agrónomo (2), San Francisco (2), Laurelty (2), Espíritu Santo (2), San Juan Calle í (1), Lucerito (1), Rincón (1)), Villa del Maestro (1), Sagrada Familia (1) y San Pedro(1), Santa Ana(1), Eugenio A. Garay(1), San Luis (1), Sinalco (1) y San Miguel y **371 casos** clasificados como probables.

Serotipo circulante: DEN-2 y DEN-4

Total de casos de chikungunya: 1 caso probable en el barrio San Miguel

Total, de casos de zika: 0

Notificaciones de Arbovirosis:

- > **1.260** sospechosos
- > **554** descartados

Gráfico 7: Curva de notificaciones. Distrito San Lorenzo. Departamento Central. SE 1 a la SE 48. Año 2019





Gráfico 8: Comparativo de años anteriores. Distrito de San Lorenzo. Desde el año 2013 al 2019.



Actualmente, la tendencia de notificaciones se encuentra por debajo del año 2013 en este mismo periodo de tiempo. En el año 2016 se observó el mayor número de notificaciones, en ese entonces el distrito de San Lorenzo llegó a registrar **entre 800 a 1.000 notificaciones por semana**

[Ir a contenido](#)

Situación Epidemiológica del distrito de Capiatá-XI Región Sanitaria-Central

Desde la SE 1 al 48 se registraron un total de **1.521 notificaciones** (*confirmados, probables y sospechosos*) de Arbovirosis (*dengue, chikungunya y zika*) en el distrito de Capiatá

Datos acumulados.

Total de casos de dengue: 441 casos de dengue: 17 casos confirmados en los barrios: Kennedy (3), Aldama Cañada (2), Yvyraró (2), barrio San Miguel (1), 29 de setiembre (1), retiro (1), San Francisco (1), Torre (1), San Jorge (1), Molino (1), Retiro (1) y Piroy (1) con 424 casos probables.

Serotipo circulante: DEN-4

Total de casos de chikungunya: 2 casos probables en el barrio Aldana Cañada y Santo Domingo.

Notificaciones de arbovirosis:

- > **1.078** sospechosos
- > **312** descartados

Gráfico 9: Curva de notificaciones, Distrito de Capiatá. Departamento Central-SE 1 a la SE 48. Año 2019





Gráfico 10: Comparativo de años anteriores. Distrito de Capiatá. Desde el año 2013 al 2019.



Actualmente, la tendencia de notificaciones se encuentra por debajo el número de notificaciones comparado con los años 2014 al 2018, En el año 2016 se observó el mayor número de notificaciones, llegando a registrar **entre 800 a 1.200 notificaciones por semana.**

[Ir a contenido](#)

Situación Epidemiológica – Distrito Mariano Roque Alonso

Desde la SE 1 al 48 se registraron un total de **1.036 notificaciones** (*confirmados, probables y sospechosos*) de Arbovirosis (*dengue, chikungunya y zika*) en el distrito de Mariano R. Alonso.

Datos acumulados.

Total de casos de dengue: 454 casos de dengue de los cuales, 12 casos confirmados 442 casos fueron clasificados como **probable**.

Notificaciones de arbovirosis:

- > **582** sospechosos
- > **277** descartados

Gráfico 11: Curva de notificaciones, Distrito de Mariano Roque Alonso. Departamento Central- SE 1 a la SE 48. Año 2019





Gráfico 12: Comparativo de años anteriores. Desde el 2014 al 2019. MRA



Actualmente, la tendencia de notificaciones se encuentra por debajo de los años 2014 al 2018, en este mismo periodo de tiempo, en este mismo periodo de tiempo. En el año 2018 se observa el mayor número de notificaciones, entre las semanas 4 a 11, donde se llegó a registrar **entre 300 a 500 notificaciones por semana**

[Ir a contenido](#)

Consideraciones finales

El contenido de este boletín puede modificarse según la dinámica de la vigilancia de las Arbovirosis.

Las notificaciones de Arbovirosis se definen operacionalmente, en este boletín, a partir de la Resolución N° 60 "Protocolo de Vigilancia de la Salud Integrada de Enfermedades Transmitidas por Vectores- Criterios de Definición de Casos y Flujograma de Caso Febril" del año 2016. Remitirse a este documento oficial para conocer las definiciones epidemiológicas de caso utilizados en este material.

Con relación al gráfico 3 Según el MOPECE (2° edición, 2011), la distribución de los casos en el tiempo permite el establecimiento de hipótesis acerca del comportamiento de una enfermedad. Además, el patrón de variación (regular o no) o comportamiento general por largos periodos de tiempo (corresponde a un tipo de tendencia secular).

[Ir a contenido](#)

Contactos

1. Oficina Regional de la XI Región Sanitaria-Unidad Epidemiológica Regional-Central
Telefax: (0295) 20031
Correo electrónico: vigiepi11region@gmail.com
2. Departamento de Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato (VENOC).
Teléfono: (021)-208-217
Correo electrónico: notifica.dgvs@gmail.com
3. Equipo técnico de la Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública-R.S.I.
Teléfono: (021)-222-012
Correo electrónico: dgvs.sala@gmail.com
4. SENEPA-Zona 11- Central
Teléfono: (021) 504 025
Correo electrónico: zona11_senepa@hotmail.com

[Ir a contenido](#)