




## VIGILANCIA DE ACCIDENTES PONZOÑOSOS NOTIFICADOS AL PNCZYCAN.

**AÑO 2023**

### 1. ACCIDENTES OFIDICOS

**Vigilancia de accidentes ofídicos. Según Departamentos de residencia.  
Paraguay, SEM 1. A SEM. 41. Año 2023.**




El Departamento de Concepción reporta la mayor cantidad de 32 casos; seguido de Paraguari y Canindeyú con 25 casos respectivamente; seguido de Itapúa y Caaguazú con 23 casos respectivamente; seguido de Central con 20 casos; seguido de Cordillera con 18 casos; seguido de Presidente Hayes con 17 casos; seguido de Caazapá con 14 casos; seguido de San Pedro y Ñeembucu con 13 casos respectivamente; seguido de Amambay con 10 casos; seguido de Alto Paraná con 9 casos; seguido de Guairá con 8 casos; seguido de Capital y Alto Paraguay con 7 casos respectivamente; seguido de Boquerón con 2 casos; seguido de Argentina con 1 caso.

**Observación:** **SUERO ANTIVENENO:** se aplicaron a 218 pacientes de 267 (82%).



## 2. ESCORPIONISMO

**Vigilancia de accidentes Ponzosñosos. Según Departamentos de residencia.  
Paraguay, SEM 1. A SEM. 41. Año 2023**




Central reporta la mayor cantidad de 56 casos; seguido de Paraguarí con 26 casos; seguido de Capital con 24 casos; seguido de Ñeembucu e Itapúa con 4 casos respectivamente; seguido de San Pedro, Cordillera y Canindeyú con 3 casos respectivamente; seguido de Presidente Hayes y Amambay con 2 casos respectivamente; seguido de Misiones, Concepción, Caaguazú, Boquerón y Alto Paraná con 1 caso respectivamente.

**Observación:** **SUERO ANTIVENENO:** se aplicaron a 10 pacientes de 132 (8%)



### 3. ARACNOIDISMO

**Vigilancia de accidentes Ponzoñosos. Según Departamentos de residencia. Paraguay, SEM. 1. A SEM 41. Año 2023.**



Central reporta la mayor cantidad de 14 casos; seguido de Capital con 9 casos; seguido de Paraguarí con 6 casos; seguido de Itapúa con 4 casos; seguido de Cordillera con 2 casos; seguido de San Pedro, Concepción, Caaguazú y Boquerón con 1 caso respectivamente.

**Observación:** **SUERO ANTIVENENO:** se aplicó a 1 paciente de 39 (3%)