




VIGILANCIA DE ACCIDENTES PONZOÑOSOS NOTIFICADOS AL PNCZYCAN.

AÑO 2023

1. ACCIDENTES OFIDICOS

**Vigilancia de accidentes ofídicos. Según Departamentos de residencia.
Paraguay, SEM 1. A SEM. 47. Año 2023.**




El Departamento de Concepción reporta la mayor cantidad de 34 casos; seguido de Paraguarí con 32 casos; seguido de Itapúa con 29 casos; seguido de Canindeyú con 28 casos; seguido de Presidente Hayes, Cordillera, Central y Caaguazú con 24 casos respectivamente; seguido de Ñeembucu y Caazapá con 15 casos respectivamente; seguido de San Pedro y Alto Paraná con 14 casos respectivamente; seguido de Amambay con 12 casos; seguido de Guairá con 9 casos; seguido de Capital y Alto Paraguay con 7 casos respectivamente; seguido de Boquerón con 4 casos; seguido de Misiones con 2 casos; seguido de Argentina con 1 caso.

Observación: **SUERO ANTIVENENO:** se aplicaron a 255 pacientes de 319 (80%).



2. ESCORPIONISMO

Vigilancia de accidentes Ponzñosos. Según Departamentos de residencia.
Paraguay, SEM 1. A SEM. 47. Año 2023




Central reporta la mayor cantidad de 206 casos; seguido de Paraguari con 62 casos; seguido de Capital con 58 casos; seguido de SD (IMT) con 39 casos; seguido de Itapua con 21 casos; seguido de Misiones con 16 casos; seguido de San Pedro y Cordillera con 14 casos respectivamente; seguido de Presidente Hayes con 9 casos; seguido de Canindeyu y Alto Paraná con 8 casos respectivamente; seguido de Ñeembucu y Guairá con 7 casos respectivamente; seguido de Concepcion con 6 casos; seguido de Caaguazú y Amambay con 3 casos respectivamente; seguido de Boquerón con 2 casos; seguido de Caazapá con 1 caso.

Observación: **SUERO ANTIVENENO:** se aplicaron a 16 pacientes de 484 (3%)



3. ARACNOIDISMO

Vigilancia de accidentes Ponzoñosos. Según Departamentos de residencia.
Paraguay, SEM. 1. A SEM 47. Año 2023.



Central reporta la mayor cantidad de 24 casos; seguido de Capital con 12 casos; seguido de Paraguari con 9 casos; seguido de Itapúa con 7 casos; seguido de Cordillera con 3 casos; seguido de Misiones, Guairá y Concepción con 2 casos respectivamente; seguido de San Pedro, Caaguazú y Boquerón con 1 caso respectivamente.

Observación: SUERO ANTIVENENO: se aplicó a 2 paciente de 64 (3%).