




## VIGILANCIA DE ACCIDENTES PONZOÑOSOS NOTIFICADOS AL PNCZYCAN.

AÑO 2024

### 1. ACCIDENTES OFIDICOS

Vigilancia de accidentes ofídicos. Según Departamentos de residencia. Paraguay, SEM 1. A SEM. 12. Año 2024.




EL Departamento de Caazapá reporta la mayor cantidad de 17 casos; seguido de Presidente Hayes con 11 casos; seguido de Central y Alto Paraná con 10 casos respectivamente; seguido de Paraguari y Guairá con 9 casos respectivamente; seguido de San Pedro con 7 casos; seguido de Canindeyú con 6 casos; seguido de Caaguazú con 5 casos; seguido de Ñeembucú y Misiones con 4 casos respectivamente; seguido de Cordillera y Alto Paraguay con 3 caso respectivamente; seguido de Concepción, Capital y Boqueón con 2 casos respectivamente.

**Observación:** **SUERO ANTIVENENO:** se aplicaron a 84 pacientes de 104 (81%).



## 2. ESCORPIONISMO

Vigilancia de accidentes Ponzñosos. Según Departamentos de residencia.  
Paraguay, SEM 1. A SEM. 12. Año 2024




Central reporta la mayor cantidad de 162 casos; seguido de Capital con 114 casos; seguido de Paraguari con 35 casos; seguido de San Pedro y Misiones con 11 casos respectivamente; seguido de Cordillera con 10 casos; seguido de Presidente Hayes con 8 casos; seguido de Itapúa y Alto Paraná con 5 casos respectivamente; seguido de SD (IMT) y Guairá con 4 casos respectivamente; seguido de Ñeembucú, Canindeyú y Caaguazú con 2 casos respectivamente; seguido de Concepción y Caazapá con 1 caso respectivamente.

**Observación:** **SUERO ANTIVENENO:** se aplico a 5 paciente de 377 (1%)



### 3. ARACNOIDISMO

Vigilancia de accidentes Ponzoñosos. Según Departamentos de residencia. Paraguay, SEM. 1. A SEM 12. Año 2024.



Central reporta la mayor cantidad de 11 casos; seguido de Paraguari y Capital con 5 casos respectivamente; seguido de Itapúa con 3 casos; seguido de Guairá y Alto Paraná con 2 casos respectivamente; seguido de Presidente Hayes, Misiones, Cordillera, Concepción y Caaguazú con 1 caso respectivamente.

**Observación:** **SUERO ANTIVENENO:** se aplicó a 6 paciente de 33 (18%).