




## VIGILANCIA DE ACCIDENTES PONZOÑOSOS NOTIFICADOS AL PNCZYCAN.

**AÑO 2024**

### 1. ACCIDENTES OFIDICOS

**Vigilancia de accidentes ofídicos. Según Departamentos de residencia.  
Paraguay, SEM 1. A SEM. 14. Año 2024.**




EL Departamento de Caazapá reporta la mayor cantidad de 19 casos; seguido de Presidente Hayes con 15 casos; seguido de Paraguarí y Alto Paraná con 13 casos respectivamente; seguido de Central con 10 casos; seguido de Guairá con 9 casos; seguido de San Pedro con 8 casos; seguido de Canindeyú con 6 casos; seguido de Ñeembucú, Misiones, Cordillera y Caaguazú con 5 casos respectivamente; seguido de Alto Paraguay con 3 casos; seguido de Concepción, Capital y Boquerón con 2 casos respectivamente.

**Observación:** **SUERO ANTIVENENO:** se aplicaron a 102 pacientes de 122 (84%).



## 2. ESCORPIONISMO

Vigilancia de accidentes Ponzñosos. Según Departamentos de residencia.  
Paraguay, SEM 1. A SEM. 14. Año 2024




Central reporta la mayor cantidad de 166 casos; seguido de Capital con 116 casos; seguido de Paraguari con 43 casos; seguido de San Pedro y Misiones con 12 casos respectivamente; seguido de Cordillera con 10 casos; seguido de Presidente Hayes con 8 casos; seguido de Alto Paraná con 6 casos; seguido de SD (IMT) e Itapúa con 5 casos respectivamente; seguido de Guairá con 4 casos; seguido de Ñeembucú con 3 casos; seguido de Canindeyú y Caaguazú con 2 casos respectivamente; seguido de Concepción y Caazapá con 1 caso respectivamente.

**Observación:** **SUERO ANTIVENENO:** se aplicó a 5 paciente de 396 (1%)



### 3. ARACNOIDISMO

**Vigilancia de accidentes Ponzoñosos. Según Departamentos de residencia.  
Paraguay, SEM. 1. A SEM 14. Año 2024.**



Central reporta la mayor cantidad de 11 casos; seguido de Capital con 6 casos; seguido de Paraguari con 5 casos; seguido de Itapúa con 3 casos; seguido de Guairá y Alto Paraná con 2 casos respectivamente; seguido de Presidente Hayes, Misiones, Cordillera, Concepción, Caazapá y Caaguazú con 1 caso respectivamente.

**Observación:** **SUERO ANTIVENENO:** se aplicó a 6 paciente de 35 (17%).