

BOLETÍN EPIDEMIOLOGICO SEMANAL

Semana Epidemiológica 38 | 2025

14 al 20 de Septiembre del 2025



Contenido

INTRODUCCIÓN	3
EVENTOS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA (ENO)	4
ENFERMEDAD TIPO INFLUENZA (ETI) e.....	5
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS GRAVES (IRAG)	5
COVID-19	13
VIGILANCIA GENÓMICA de SARS-CoV-2	16
ARBOVIROSIS	17
CHIKUNGUNYA	21
OROPOUCHE Y MAYARO	24
SÍNDROME NEUROLÓGICO CON ASOCIACIÓN A VIRUS ZIKA	26
SÍNDROME CONGÉNITO/MICROCEFALIA ASOCIADA A VIRUS ZIKA	27
VIGILANCIA UNIVERSAL – MENINGOENCEFALITIS AGUDA Y ENFERMEDADES MENINGOCÓCCICA	28
OTRAS ENFERMEDADES VECTORIALES	32
ZOONÓTICAS	33
CASOS DE EXPOSICIÓN HUMANA A VIRUS RÁBICO	34
ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNAS	37
MONITOREO DE LAS NOTIFICACIONES DE EVENTOS DE NOTIFICACIONES OBLIGATORIAS (ENO).....	44
VIRUELA SÍMICA (MPOX)	51
REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL	54
CALENDARIO EPIDEMIOLÓGICO	55

INTRODUCCIÓN

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Paraguay tiene carácter universal, su población de estudio es toda persona que habita en el territorio nacional, y su alcance abarca los diferentes subsistemas de salud: privado, público, seguridad social, organizaciones no gubernamentales. Este sistema de vigilancia epidemiológica se sustenta por una red de vigilancia cuya organización central se encuentra representada por la Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS), dependiente del Viceministerio de Rectoría y Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

La Red de Vigilancia Nacional se organiza en tres niveles de gestión, el nivel nacional liderado por la DGVS, nivel regional que comprenden a 18 Unidades Epidemiológicas Regionales, que a su vez abarcan a 1.491 unidades notificadoras actualmente. Toda la información de esta red de vigilancia es consolidada, analizada y presentada en este boletín epidemiológico que tiene una periodicidad semanal.

El Boletín Epidemiológico Semanal es el documento oficial de difusión de la DGVS, y comunica la situación de los eventos bajo vigilancia de notificación obligatoria, según el listado de la Resolución S.G. N.º 0057/2023. Su finalidad es difundir la situación epidemiológica del país, la ocurrencia de brotes y/o epidemias para una adecuada y oportuna toma de decisiones en prevención y control en salud pública.

La presentación de datos está organizada en apartados que incluye un resumen de las enfermedades de notificación obligatoria a la semana epidemiológica correspondiente, enfermedades vectoriales, enfermedades respiratorias, zoonosis, enfermedades prevenibles por vacunación, así como eventos de salud pública de importancia nacional (ESPIN) y de importancia internacional (ESP II).

Los datos correspondientes al año 2025, están sujetos a modificaciones conforme se apliquen procesos de ajuste, validación o depuración técnica, en función a los procesos de cierre correspondiente.

EVENTOS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA (ENO)

Tabla 1. Comparativo de números de casos y tasas de incidencia acumulada de los eventos de notificación obligatoria (ENO) en Paraguay, con respecto al mismo período de los años 2023, 2024 y 2025 (hasta la SE 38)

Enfermedades de Notificación Obligatoria		Año 2023		Año 2024		Año 2025		
		N° de Casos Acum.	Tasa x 100.000 hab.	N° de Casos Acum.	Tasa x 100.000 hab.	N° de Casos Acum.	Tasa x 100.000 hab.	
Vectoriales y Zoonóticas	Dengue	9.097	143,78	86.273	1353,81	1.705	26,57	
	Chikungunya	115.441	1824,63	40	0,63	50	0,79	
	Zika	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	Fiebre Amarilla	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	Leishmaniosis	Visceral	61	0,96	40	0,63	65	1,01
		Tegumentaria	37	0,58	45	0,71	48	0,75
	Chagas	Agudo	1	0,02	1	0,02	1	0,02
		Crónico	136	2,15	134	2,10	178	2,77
	Paludismo	Autóctono	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		Importado	0	0,00	2	0,03	2	0,03
	Parálisis aguda flácida (PAF)*	24	1,47	24	1,48	24	1,49	
	Poliomielitis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	Sarampión	0	0,00	0	0,00	1.003	15,63	
	Rubeola	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	Tétanos Neonatal **	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	Tétanos otras edades (TOE)	2	0,03	5	0,08	2	0,03	
	Tos Convulsa	6	0,09	1	0,02	60	0,94	
	Parotiditis	185	2,92	395	6,20	354	5,52	
	Varicela	1.003	15,85	1.347	21,14	1.746	27,21	
	Difteria	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Enfermedades Gastroentéricas	Enf. Transmit. por Alimentos	208	3,29	295	4,63	85	1,32	
	Cólera	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Enf. Meningocócica	con MBA	3	0,05	5	0,08	14	0,22	
	sin MBA	2	0,03	1	0,02	1	0,02	
Otros eventos	Sx pulmonar por Hantavirus	24	0,38	9	0,14	8	0,12	
	Intoxicación por Pesticidas	88	1,39	29	0,46	29	0,45	
	Rabia Humana	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	Rabia Canina	1	0,02	2	0,03	1	0,02	
	Accidentes Ponzoñosos	373	5,90	723	11,35	1.252	19,51	
	Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	Peste	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	Brucelosis	11	0,17	0	0,00	1	0,02	
	Leptospirosis	3	0,05	4	0,06	0	0,00	

Accidentes ponzoñosos incluyen: Accidentes Ofídicos, Escorpionismo y aracnoidismo

* Datos Obtenidos de la Vigilancia de PAF de Notificaciones por 100000 <15 años

**Tetanos Neonatal por 100000 nacidos vivos

Observación: Los Datos son parciales sujeto a modificación

Fuente: VENOCD/DGVS

ENFERMEDAD TIPO INFLUENZA (ETI) E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS GRAVES (IRAG)

Resumen de situación de ETI e IRAG


Las consultas por Enfermedad Tipo Influenza (ETI) a nivel país según reporte por planilla semanal, registra un aumento del 11% respecto a la semana anterior, registrándose la curva por debajo del umbral de alerta. En la vigilancia centinela, los hospitalizados por Infecciones Respiratorias Agudas (IRAG) para la SE 38, se registran 350 casos, y las proporciones acumuladas de ingreso a UCI y fallecidos son del 14% y 3% respectivamente. Los virus respiratorios identificados (SE 37), Rhinovirus (30), VSR (11), Metapneumovirus (11), SARS-CoV-2 (6), Influenza B (2), Adenovirus (2) y Parainfluenza (1). A continuación, se presenta los datos de la vigilancia universal a la SE 37, y los datos de la vigilancia centinela a la SE 38 del 2025.

Vigilancia Universal de ETI

Desde la SE 1 a la SE 37 del 2025, las notificaciones de Enfermedades de Tipo Influenza (ETI) acumulan 1.078.169 consultas ambulatorias¹. En la SE 37 se registraron 34.553 en las consultas de ETI, registrándose la tendencia por debajo del umbral de alerta (Gráfico 1).

En la SE 37 del 2025, se observa un aumento para infección respiratoria aguda no neumonía (IRANN), Enfermedad Tipo Influenza (ETI) e Infecciones Respiratorias Agudas Grave (IRAG) en el grupo de los menores de 5 años. En el grupo de mayores de 5 años se observa un aumento para IRANN, ETI e IRAG (Gráfico 2 y 3).


Gráfico 1. Comparativo del número de consultas por ETI en la Vigilancia Universal, Paraguay, SE 37 del 2025 (comparativo 2014-2019 y 2023)



Fuente: Vigilancia de Enfermedades de Notificación Obligatoria-DGVS.


¹ Los datos de la vigilancia universal de ETI, corresponden a la SE 37 del 2025. En tanto que, los datos de la vigilancia centinela de IRAG, se incluyen datos parciales de la SE 38 del 2025.

Gráfico 2. Tendencia de IRANN, ETI e IRAG por SE en <5 años en la Vigilancia Universal, Paraguay, SE 1 del 2023 a SE 37 del 2025



Fuente: Vigilancia de Enfermedades de Notificación Obligatoria-DCNIE-DGVS.
 Elaborado por: Programa de Vigilancia Especiales y Centinelas. DCNIE-DGVS.

Gráfico 3. Tendencia de IRANN, ETI e IRAG por SE en >5 años en la vigilancia universal, Paraguay, SE 1 del 2023 a SE 37 del 2025




Fuente: Planilla Semanal ENO, Vigilancia de Enfermedades de Notificación Obligatoria-DCNIE-DGVS
 Elaborado por: Programa de Vigilancia Especiales y Centinela, DNCIE-DGVS.

Vigilancia Centinela de IRAG

La Vigilancia Centinela de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), incluye el monitoreo y caracterización de casos hospitalizados en 10 centros centinelas (hospitales seleccionados), con el objetivo de conocer las características epidemiológicas, factores de riesgos y los agentes etiológicos de IRAG durante todo el año en Paraguay. Los datos a la SE 38, son parciales sujetos a modificaciones.

Desde la SE 1 a la SE 38 del 2025, se registraron 12.080 casos acumulados de IRAG. En la SE 38, se registraron 322 hospitalizados por IRAG, el 56% (181/322) corresponde a edad pediátrica y 44% (141/322) en edad adulta (Gráfico 4, Tabla 2).

Gráfico 4. Número de hospitalizados por IRAG según semana epidemiológica, Vigilancia Centinela, Paraguay, SE 1/2023 a SE 38/2025



Elaborado por: Programa de Vigilancia Centinelas y Especiales-DCNIE-DGVS


Tabla 2. Número de hospitalizados por IRAG según grupos de edad, Vigilancia Centinela, Paraguay, SE 1 hasta la SE 38/2025

Grupo Etario	N° Hospitalizados	%
<2	2603	21%
2 a 4	1332	11%
5 a 19	2175	18%
20 a 39	1164	10%
40 a 59	1427	12%
60 y más	3379	28%
Total, general	12.080	100%

Elaborado por: Programa de Vigilancia Centinelas y Especiales-DCNIE-DGVS


En el comparativo con años anteriores, se registran aumento en las hospitalizaciones por IRAG en el grupo de 5 a 19 años, seguido de 2 a 4 años respectivamente (Gráfico 5 y 6).

Gráfico 5. Casos hospitalizados por IRAG en edad pediátrica según semana epidemiológica, Vigilancia Centinela, Paraguay, años 2023, 2024 y 2025* (hasta la SE 38)



Fuente: Vigilancia Centinela IRAG/Vigilancias Especiales y Centinela (VE y C)-DGVS


Gráfico 6. Casos hospitalizados por IRAG en edad adulta según semana epidemiológica, Vigilancia Centinela, Paraguay, años 2023, 2024 y 2025* (hasta SE 38)



Fuente: Vigilancia Centinela IRAG/Vigilancias Especiales y Centinela (VE y C)-DGVS

En la SE 38 se identificaron 63 hospitalizados por IRAG asociados a Virus respiratorios: Rhinovirus (30), Metapneumovirus (11), VSR (11), SARS-CoV-2 (6), Influenza B (2), Adenovirus (2), Parainfluenza (1) (Gráfico 7).


Gráfico 7. Distribución de virus respiratorios identificados en casos hospitalizados por IRAG según semana epidemiológica, Vigilancia Centinela, Paraguay, años 2024 (SE 1 a 52) y 2025* (SE 1 a 38)



Fuente: Laboratorio Central de Salud Pública (LCSP)/Laboratorios Centros Centinelas/Laboratorios Regional.
 Elaborado por: Programa de Vigilancia Centinelas y Especiales. DGVS.

En la SE 38 se identificaron cinco fallecidos asociados a virus Respiratorios: Metapneumovirus, Rhinovirus, VSR, SARS CoV2 (Gráfico 8).


Gráfico 8. Distribución de virus respiratorios identificados en casos fallecidos por IRAG según semana epidemiológica, Vigilancia Centinela, Paraguay, desde (SE 1 a 52) del 2024 y (SE 1 a 38 del 2025)



Elaborado por: Programa de Vigilancia Centinelas y Especiales. DGVS

En la temporada actual, la actividad de Influenza fue predominante por Influenza A (H1N1), registrando picos históricos de hospitalizados y fallecidos por influenza desde el 2016 (Gráfico 9). Para el 2025 (hasta SE 38), se registraron 1.048 casos IRAG asociados a Influenza A (H1N1), con 167 en UCI y 126 fallecidos. De estos, 58% eran de edad adulta (53% mayores de 60 años). Según la subtipificación, el 90% Influenza A H1N1, 7% Influenza A no Subtipificado, y 3% Influenza B.


Gráfico 9. Distribución de Influenza en hospitalizados por IRAG según semana epidemiológica. Vigilancia Centinela, Paraguay, año 2016 a 2025 hasta SE 38*



Fuente: Laboratorio Central de Salud Pública (LCSP)/Laboratorios Centros Centinelas/Laboratorios Regionales

La circulación de VSR muestra un comportamiento similar al año 2024, pero una disminución de casos y fallecidos, sobre todo en el grupo de menores de 6 meses para la temporada actual (Gráfico 10). Se registran 25 fallecidos, ninguno en menores de 6 meses (población objetivo Nirsevimab).

Gráfico 10. Distribución de Virus sincitial respiratorio (VSR) en hospitalizados por IRAG según semana epidemiológica. Vigilancia Centinela, Paraguay, año 2016 a 2025 (SE 1 a SE 38)



Fuente: Laboratorio Central de Salud Pública (LCSP)/Laboratorios Centros Centinelas/Laboratorios Regionales

Más información disponible en: <https://sistemasdgvs.mspbs.gov.py/sistemas/irag/>

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), culminó con éxito la primera campaña nacional de inmunización con Nirsevimab, con esta primera campaña nacional, dirigida a niños nacidos entre enero y julio de este año, no se registraron muertes por el virus en bebés menores de 6 meses. El Nirsevimab es un anticuerpo monoclonal de acción prolongada que brinda inmunidad pasiva frente al VRS, principal causa de infecciones respiratorias graves en lactantes, gracias a la inmunización con Nirsevimab, protegimos a 40.000 lactantes, logrando una reducción del 73% en hospitalizaciones relacionadas al VRS. Cero muertes por VRS en bebés menores de 6 meses, una política pública basada en evidencia que demostró salvar vidas. Para el año 2026, renovamos nuestro compromiso para ampliar esta protección.

Disponible en <https://pai.mspbs.gov.py/paraguay-logra-proteccion-de-40-000-lactantes-contra-el-virus-respiratorio-sincitial-con-nirsevimab/>

REPORTE SEMANAL DE VIRUS RESPIRATORIO – BRASIL Y CONO SUR, SE 37/2025

Brasil y Cono Sur: La actividad de influenza en la subregión, impulsada principalmente por Influenza A, aumenta esta SE, con una positividad actual de 3,2%. La circulación del VSR en la última semana, indicando una positividad del 9.7%. La actividad de SARS-CoV-2 se mantiene en niveles bajos, sin embargo, comienza a mostrar una tendencia al ascenso con una positividad del 5%.

Por país:

Argentina: La circulación de influenza se mantiene en niveles interestacionales, La actividad del VSR ha disminuido en la última SE con una positividad de 26%, y la actividad de SARS-CoV-2 se mantiene en una tendencia al ascenso, y una positividad del 7.8%


Brasil: La circulación de influenza, principalmente A(H3N2) e influenza B, continúa disminuyendo, con una positividad de 1,9%, situándose por debajo del umbral epidémico. La circulación de VSR la tendencia se mantiene baja, mientras que para SARS-CoV-2 aumenta levemente con una positividad del 7,5%. Los casos SARI se mantienen por debajo de niveles moderados, con la mayoría de los casos asociados a VSR, seguidos de SARS-CoV-2.

Chile: La actividad de influenza aumenta levemente en la última SE, con una positividad de 6.7%. La actividad de SARS-CoV-2 se mantiene baja y estable, mientras que la circulación de VSR mantiene niveles altos y disminuyendo respecto a la SE anterior, alcanzando una positividad de 14,7%. La mayor proporción de casos SARI corresponden a VSR.

Paraguay: La actividad de influenza continúa disminuyendo, con la mayoría de los casos atribuidos a Influenza B y una positividad de 2.3%. Los casos ILI se mantienen por debajo del umbral epidémico. La actividad del VSR disminuye la última SE, alcanzando una positividad de 16.2% y reflejándose en la detección de casos SARI. La circulación de SARS-CoV-2 se mantiene baja y con tendencia al ascenso.

Uruguay: La positividad influenza B/Victoria se mantiene bajo el umbral estacional esta SE, alcanzando un 8.3% de positividad. Los casos SARI disminuyen a niveles epidémicos, asociados principalmente con VSR. La circulación del VSR disminuyó con una positividad de 23.9%, y la actividad de SARS-CoV-2 se mantiene baja y estable.

Figura 1. Situación Semanal de Virus Respiratorio, Brasil y Cono Sur, SE 37/2025



Fuente: <https://www.paho.org/es/informe-situacion-influenza>

COVID-19

En Paraguay, la vigilancia de COVID-19 aún se mantiene como vigilancia universal, además de la incorporación vigilancia centinela de ETI /IRAG y vigilancia genómica en hospitales centinelas. Este informe descriptivo, incluye las detecciones de SARS-CoV-2 a la SE 38, notificadas al sistema RESPIRATORIO V2-DGVS, MSPBS.

A pesar de que los casos de COVID-19 han disminuido a nivel nacional en comparación con años anteriores, la enfermedad sigue presente y continúa registrándose nuevos casos, aunque en un nivel bajo (Tabla 3). Durante el año 2024 (SE 1 al 52) se registraron 16.316 casos COVID-19, de los cuales 1.473 (9%) fueron hospitalizados y 123 fallecidos (TL=0,75%).

En lo que va el 2025 (SE 1 a SE 38), se registran 5.067 casos confirmados, 638 (12,6%) hospitalizados y 31 (TL=0,71%) fallecidos por COVID-19 (Tabla 3).

Tabla 3. Datos acumulados de casos, hospitalizados y fallecidos por COVID-19 en Paraguay, desde 2020 hasta la SE 38/2025*(20/09 /2025)


Años	Casos confirmados	Hospitalizados	Fallecidos
2020	108.030	8.936	2.499
2021	364.681	39.593	14.377
2022	330.454	12.489	2.896
2023	22.359	2.307	323
2024	16.316	1.473	123
2025*	5.067	638	31

*Datos parciales

Fuente: Respiratorio V2-DGVS, MSPBS. Elaborado por Centro Nacional de Información Epidemiológica-DGVS.

Para el cálculo de las tasas se utilizó la población del año 2024 según el Censo Nacional de Población y Viviendas del año 2012. INE.

Gráfico 11. Curva epidémica de casos COVID-19, según semana epidemiológica, Paraguay, SE 1 del 2024 hasta la SE 38/2025 (*Datos parciales)



Fuente: Respiratorio V2-DGVS, MSPBS. Elaborado por Centro Nacional de Información Epidemiológica-DGVS.

Situación actual COVID-19

En lo que va el 2025 (SE 1 a SE 38), a nivel país se registraron 5.067 casos COVID-19, con una T.I.A. de 66 casos por 100 mil habitantes. La mayor incidencia de casos COVID-19 se registran en el departamento Asunción (307,9 por 100 mil habitantes) y Guairá (120,5 por 100 mil habitantes). Se registran 626 hospitalizados, lo que corresponde al 12,6% del total de casos. Se registraron en total 31 fallecidos, lo que representa una tasa de letalidad del 0,7 % y una tasa de mortalidad de 0,4 por cada 100.000 habitantes (Tabla 4).

En la última semana (SE 38) se registraron 154 casos, de los cuales nueve requirieron de hospitalización, no se ha registrado ningún fallecido por COVID-19 desde la semana 25.

Tabla 4. Casos confirmados, hospitalizados y fallecidos COVID-19, según departamento de procedencia, Paraguay, SE 1 a la SE 38 del 2025

Departamento	Casos confirmados	Hospitalizados	Fallecidos	Tasa de incidencia*	Tasa de hospitalización	Tasa de mortalidad*	Tasa de letalidad (%)
CENTRAL	1.812	236	11	76,4	13,0%	0,5	0,61%
ASUNCIÓN	1.606	135	1	307,9	8,4%	0,2	0,06%
ITAPÚA	359	44	3	55,1	12,3%	0,5	0,84%
GUAIRÁ	286	38	4	120,5	13,3%	1,7	1,40%
PARAGUARÍ	188	18	0	71,1	9,6%	0,0	0,00%
ALTO PARANÁ	127	27	0	14,5	21,3%	0,0	0,00%
CORDILLERA	98	17	1	30,0	17,3%	0,3	1,02%
CONCEPCIÓN	100	14	2	37,1	14,0%	0,7	2,00%
CAAGUAZÚ	89	24	5	15,1	27,0%	0,8	5,62%
CANINDEYÚ	90	14	1	35,6	15,6%	0,4	1,11%
AMAMBAY	86	29	1	47,2	33,7%	0,5	1,16%
ÑEEMBUCÚ	49	5	0	53,2	10,2%	0,0	0,00%
MISIONES	51	9	1	37,8	17,6%	0,7	1,96%
PTE HAYES	53	4	0	38,6	7,5%	0,0	0,00%
SAN PEDRO	44	15	1	9,6	34,1%	0,2	2,27%
CAAZAPA	16	5	0	7,9	31,3%	0,0	0,00%
BOQUERÓN	9	3	0	12,6	33,3%	0,0	0,00%
ALTO PARAGUAY	4	1	0	20,3	25,0%	0,0	0,00%
TOTAL	5.067	638	31	66,2	12,6%	0,4	0,61%

* por 100.000 habitantes

*Para el cálculo de las tasas se utilizó la población para el año 2024 según el Censo Nacional de Población y Viviendas del año 2012. INE. Fuente: Respiratorio V2-DGVS, MSPBS. Elaborado por Centro Nacional de Información Epidemiológica-DGVS.

Al analizar el perfil epidemiológico de los casos confirmados por grupos etarios, se observa que la mayor proporción corresponde al grupo de 20 a 39 años. Sin embargo, la hospitalización predomina en los extremos de la vida, en el grupo de mayores de 60 años. En cuanto a los fallecidos, la mayoría fueron en adultos mayores de 60 años (Tabla 5).

Tabla 5. Casos confirmados, Hospitalizados y fallecidos COVID-19, por grupos de edad, Paraguay, SE 1 al SE 38 del 2025

GRUPO DE EDAD	Casos confirmados	Hospitalizados	Fallecidos	Tasa de incidencia*	Tasa de hospitalización	Tasa de mortalidad*	Tasa de letalidad (%)
0 a 4	429	102	0	60,5	23,8%	0,0	0,00%
5 a 9	315	57	1	44,7	18,1%	0,1	0,32%
10 a 14	199	22	0	28,5	11,1%	0,0	0,00%
15 a 19	210	11	0	30,7	5,2%	0,0	0,00%
20 a 24	380	33	1	57,4	8,7%	0,2	0,26%
25 a 29	542	39	0	84,2	7,2%	0,0	0,00%
30 a 34	493	31	2	80,5	6,3%	0,3	0,41%
35 a 39	428	19	2	75,3	4,4%	0,4	0,47%
40 a 44	326	25	0	66,6	7,7%	0,0	0,00%
45 a 49	299	22	1	75,1	7,4%	0,3	0,33%
50 a 54	286	28	3	81,4	9,8%	0,9	1,05%
55 a 59	231	22	2	75,7	9,5%	0,7	0,87%
60 a 64	221	29	2	86,3	13,1%	0,8	0,90%
65 a 69	228	47	2	109,2	20,6%	1,0	0,88%
70 a 74	142	31	3	92,8	21,8%	2,0	2,11%
75 a 79	108	28	1	110,2	25,9%	1,0	0,93%
80 y +	230	92	11	206,2	40,0%	9,9	4,78%
TOTAL	5.067	638	31	66,2	12,6%	0,4	0,61%

* por 100.000 habitantes

*Para el cálculo de las tasas se utilizó la población para el año 2024 según el Censo Nacional de Población y Viviendas del año 2012. INE.
Fuente: Respiratorio V2-DGVS, MSPBS. Elaborado por Centro Nacional de Información Epidemiológica-DGVS.

Más detalles, disponible en: <https://dgv.mspps.gov.py/reporte-covid-19/>


VIGILANCIA GENÓMICA DE SARS-COV-2

Actualización sobre circulación de variantes en Paraguay

De acuerdo al informe del Laboratorio Central de Salud Pública, de enero a agosto del 2025, ingresaron 713 muestras positivas para SARS-CoV-2, de las cuales fueron seleccionadas 17 muestras para la secuenciación siguiendo directrices de la Organización Mundial de la Salud, que se enfoca en la vigilancia del comportamiento genético del virus para la búsqueda de nuevas mutaciones que pueden evolucionar con el tiempo.

La gráfica 12, detalla la proporción de linajes de Ómicron por mes. El clado BA.2.86 es el predominante desde agosto del 2024

Grafica 12: Prevalencia de linajes de Ómicron. Los linajes señalados con la letra X engloba a variantes del mismo sublinaje



Fuente: Base de datos del LCSP

CONCLUSIONES

La proporción semanal de la variante bajo monitoreo (VUM) LP.8.1 entre todas las secuencias de SARS-CoV-2 enviadas a GISAID continúa aumentando, en Paraguay circulan cuatro sublinajes de LP.8.1: LP.8.1.1, LP.8.1.3, NY.6, PD.1. y PP.1.

Fuente: Informe de Vigilancia Genómica, Laboratorio Central de Salud pública -MSPBS.

ARBOVIROSIS DENGUE

Metodología

Para el análisis de la información se tuvo en cuenta las siguientes definiciones de caso establecidas en el protocolo de vigilancia en salud pública del evento, disponible en: <https://dgvs.mspbs.gov.py/wp-content/uploads/2023/10/RESOLUCION-SG.-N%C2%B0-0335-2023.pdf>

Definiciones utilizadas para los siguientes cálculos

Tasa de incidencia acumulada: casos sospechosos + confirmados + probables de dengue/población x 100.000 habitantes.


Cálculo de letalidad: número de fallecidos confirmados de dengue/número de casos confirmados de dengue x 100

Cálculo de mortalidad: número de fallecidos por dengue / Población total x 100.000 habitantes.

Período 2024-2025 (SE 29/2024 a SE 28/2025)

En el último periodo abarca desde la SE 29 del 2024 hasta la SE 28 del 2025 (datos parciales), se han registrado 61.818 notificaciones de dengue, registrándose un pico para la SE 10/2025, y 692 notificaciones de Chikungunya. La incidencia acumulada a nivel país es de 576/100 mil habitantes. Se han registrado la circulación de los serotipos DEN-1, DEN-2 y DEN-3, con predominio de DEN-1 con el 56% (Tabla 6).

Gráfico 13. Curva de notificaciones acumuladas de Dengue, según semana epidemiológica de inicio de síntomas, Paraguay, (SE 29/2024 a SE 38/2025)



*El total de la N, corresponde al corte de la SE 29/2024 a la SE 38/2025

Fuente: Vigilancia de Enfermedades Vectoriales y Zoonóticas, DGVS-MSPBS.

Tabla 6. Resumen período epidémico 2024/2025 (SE 29/2024 a SE 28/2025)

Arbovirosis	Notificados	Confirmados*	Tasa incidencia**	Fallecidos
Dengue	61.818	2.188	576	2
Chikungunya	692	55	1	0
Zika	0	0	0	0

Fuente: Vigilancia de Enfermedades Vectoriales y Zoonóticas, DGVS-MSPBS

¹ para la tasa de incidencia se incluyen casos confirmados, probables y sospechosos para dengue.

² promedio de la Población estimada para el 2023 y 2024: 7.605.506 personas (Fuente INE).

Disponibile en: <https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-aumento-casos-dengue-region-americas-18-junio-2024>


*Fin del período epidémico. Disponible en: <https://dgvs.mspbs.gov.py/finaliza-periodo-epidemico-de-dengue-con-mas-de-101-600-casos-acumulados/>

Periodo actual de monitoreo 2025/2026

Entre las SE1 a SE 38 a nivel país se registraron un total de 42.044 notificaciones, observándose un pico en la SE 10 con 1976 notificaciones.

El periodo de monitoreo actual 2025/2026, que inicio en la SE 29 del 2025, y abarca hasta la SE 38 del 2025, se han registrado 3.967 notificaciones, con una incidencia acumulada de 36 notificaciones por 100 mil habitantes. Se ha confirmado la circulación de los serotipos DEN-1 (Gráfico 2 y Tabla 2).

Gráfico 14. Curva de notificaciones, Paraguay, desde SE 01 a SE 38 del 2025



Fuente: Vigilancia de Enfermedades Vectoriales y Zoonóticas, DGVS-MSPBS.

Tabla 2. Resumen período actual, Paraguay, SE 29/2025 a SE 38/2025

Arbovirosis	Notificados	Confirmados ²	Tasa incidencia*	Fallecidos
Dengue	3.967	18	36	0
Chikungunya	44	0	0	0

Fuente: Vigilancia de Enfermedades Vectoriales y Zoonóticas, DGVS-MSPBS

*Tasa de incidencia por 100.000 habitantes: $\text{casos sospechosos} + \text{confirmados} + \text{probables de dengue} / \text{población} \times 100.000$ habitantes

Tabla 3. Número de casos (confirmados, probables y sospechosos) y tasas de incidencias acumuladas de dengue por departamento, Paraguay, 2025-2026*

Departamento de residencia	Periodo 2025-2026*	
	SE 29/2024 a SE 38/2025	
	N° de casos	TIA*
Alto Paraguay	10	55
Asunción	448	92
Boquerón	55	74
Paraguarí	94	45
Guairá	84	45
Central	846	43
Pte. Hayes	55	42
Concepción	69	32
Misiones	30	26
San Pedro	131	35
Ñeembucú	25	31
Itapúa	134	28
Canindeyú	53	26
Cordillera	73	26
Caazapá	23	16
Amambay	28	15
Caaguazú	58	13
Alto Paraná	99	12
TOTAL	2.315	36

Fuente: Vigilancia de Enfermedades Vectoriales y Zoonóticas, DGVS-MSPBS

² *Casos Confirmados: todo caso sospechoso que cuenta con al menos un resultado positivo mediante: 1. Detección de ARN viral por RT-PCR. 2. Detección de la proteína viral NS1 mediante ELISA. 3. Detección de la presencia del virus mediante aislamiento viral. 4. Aumento de 4 veces en el valor de título de anticuerpos neutralizantes específicos para DENV (muestras recogidas con al menos 14 días de diferencia).


Tabla 4. Número de casos (confirmados, probables y sospechosos) de dengue por grupo de edad y sexo, Paraguay, periodo SE 29/2025 a SE 38/2025.

Grupo de edad (años)	2025		Total	%
	Femenino	Masculino		
0 a 4	181	179	360	16%
5 a 9	106	125	231	10%
10 a 14	75	114	189	8%
15 a 19	109	104	213	9%
20 a 24	137	93	230	10%
25 a 29	115	82	197	9%
30 a 34	124	90	214	9%
35 a 39	106	39	145	6%
40 a 44	70	57	127	5%
45 a 49	65	32	97	4%
50 a 54	47	27	74	3%
55 a 59	43	23	66	3%
60 a 64	26	23	49	2%
65 a 69	23	21	44	2%
70 a 74	12	12	24	1%
75 a 79	12	8	20	1%
80 y más	14	21	35	2%
Total	1.265	1.050	2.315	100%

Fuente: Vigilancia de Enfermedades Vectoriales y Zoonóticas, DGVS-MSPBS.

El 59% de los casos (10/17) corresponde al sexo masculino. La distribución de casos por grupos de edad se concentra principalmente en el grupo de 30 a 34 años y 35 a 39 años con 17% (3/18) cada uno, seguido de los grupos de 5 a 9 años, 20 a 24 años y 40 a 44 años con el 11% (2/18) cada uno y los de 10 a 14, 45 a 49 y 70 a 74 años con el 6% (1/18) cada uno.

Mapa 1. Distribución de serotipos de dengue por distritos, datos acumulados, periodo 2025-2026 (SE 29/2025 a SE 38/2025)



Fuente: Vigilancia de Enfermedades Vectoriales y Zoonóticas, DGVS-MSPBS

Resumen últimas tres semanas, SE 36, SE 37 y SE 38

Ingresaron en promedio de 257 notificaciones por semana (sin descartados), identificándose dos casos de DENV (1 confirmado + 1 probable). La tasa de incidencia es de 12 casos/100.00 habitantes.

Con respecto a la distribución de casos confirmados y probables; los grupos de edad de 0 a 4 años y 50 a 54 años.

La positividad por PCR es 0,2%, con identificación de un caso del serotipo de DEN-1.

Tabla 5. Resumen últimas 3 semanas, SE 36 a la SE 38

CIERRE DE CASOS	SE 36	SE 37	SE 38	ÚLTIMAS 3 SE	%
CONFIRMADO	1	0	0	1	0%
PROBABLE	0	0	1	1	0%
SOSPECHOSO	223	241	306	770	64%
DESCARTADO	150	172	105	427	36%
NOTIFICACIONES	374	413	412	1.199	100%

Fuente: Vigilancia de Enfermedades Vectoriales y Zoonóticas, DGVS-MSPBS.

Tabla 6. Serotipos identificados en las últimas tres semanas, SE 36 a SE 38 del 2025

Serotipos	N° de casos	%
DENGUE-1	1	100%
DENGUE-2	0	0%
DENGUE-3	0	0%
Total	1	100%

Fuente: Vigilancia de Enfermedades Vectoriales y Zoonóticas, DGVS-MSPBS


CHIKUNGUNYA

Periodo de Monitoreo 2025/2026

Entre la SE 1 a la SE 38 del 2025 a nivel país se registran un total 205 notificaciones, de estos 50 casos fueron Chikungunya. El 84% de los casos se concentran en Amambay (22), Itapúa (12) y Guairá (8).

Para el periodo actual de la SE 29 hasta la SE 38 del 2025, se han registrado 20 notificaciones. Ningún caso confirmado de Chikungunya (Gráfico 15 y Tabla 13).

Gráfico 15. Casos de Chikungunya, Paraguay, según semana de inicio de síntomas y clasificación final, periodo 2024-2025* (SE 01 a SE 38/2025)



Fuente: Vigilancia de Enfermedades Vectoriales y Zoonóticas, DGVS-MSPBS

Tabla 7. Número de casos (Confirmados y Probables) y tasas de incidencias acumuladas de Chikungunya por departamento, Paraguay, SE 01 a SE 38/2025

Departamento de residencia	Nº de casos	TIA*
Amambay	22	12
Itapuá	12	3
Guaira	8	4
Misiones	4	3
Asunción	3	1
Canindeyú	1	0
Central	0	0
San Pedro	0	0
Caaguazú	0	0
Alto Paraná	0	0
Cordillera	0	0
Paraguarí	0	0
Pte. Hayes	0	0
Caazapá	0	0
Boquerón	0	0
Concepción	0	0
Alto Paraguay	0	0
Ñeembucú	0	0
Total	50	1

Fuente: PNEV/DGVS/MSPBS

*Tasa de incidencia calculada en base a cada 100.000 habitantes El total de casos incluye probables y confirmados

*La incidencia fue calculada sobre casos de Chikungunya (confirmados + probables) /100.000.

Tabla 8. Número de casos (Confirmados y Probables) de Chikungunya por grupo de edad y sexo, Paraguay, SE 01 A SE 38 del 2025.

Grupos de edad (años)	Femenino	Masculino
0 a 4	1	1
5 a 9	1	1
10 a 14	6	4
15 a 19	1	2
20 a 24	2	2
25 a 29	1	0
30 a 34	3	1
35 a 39	3	2
40 a 44	4	2
45 a 49	2	0
50 a 54	1	0
55 a 59	3	1
60 a 64	1	0
65 a 69	1	1
70 a 74	0	1
75 a 79	0	0
80 y más	1	1
Total	31	19

Fuente: PNEV/DGVS/MSPBS

Mortalidad por Arbovirosis

Año 2024:

Acumulados desde la SE 1 a la SE 52: 135 defunciones confirmadas por dengue y 1.134 descartados. No se registran fallecidos por Zika ni Chikungunya.

Año 2025:

Desde la SE 1 a la SE 38: Se ha registrado un caso fallecido confirmado por dengue.

Últimas 3 semanas (SE 36 a SE 38/2025):

No se registran defunciones confirmadas por dengue, y 9 descartados

Fuente: Vigilancia de mortalidad ViMo-VRESP, DGVS.


Más detalles, disponible en: https://dgvs.mspbs.gov.py/sala_situaciones_arbovirosis

ORPOUCHE Y MAYARO

El 13 de diciembre del 2024, la Organización Panamericana de la salud (OPS) ha emitido una Alerta Epidemiológica de Oropouche en la Región de las Américas.

En Paraguay, hasta la SE 38 del 2024 hasta la SE 38 del 2025, se han procesado 2.420 muestras para Oropouche y Mayaro, todas con resultado de RT-PCR negativo para ambos virus (Gráfico 16).

Gráfico 16. Número de muestras procesadas para Oropouche y Mayaro, según semana de inicio de síntomas y clasificación final, periodo 2024-2025* (SE 1 a SE 38/2025)



Fuente: Vigilancia de Enfermedades Vectoriales y Zoonóticas, DGVS, MSPBS.

Tabla 14. Número de muestras procesadas para Oropouche y Mayaro, periodo 2024-2025* (SE 1 a SE 38/2025)

DEPARTAMENTO	N° MUESTRAS PROCESADAS	%
Central	1170	48,35%
Asunción	498	20,58%
Pte. Hayes	188	7,77%
Alto Paraná	156	6,45%
Boquerón	84	3,47%
Cordillera	68	2,81%
Ñeembucú	47	1,94%
Itapúa	39	1,61%
Paraguarí	34	1,40%
Amambay	31	1,28%
San Pedro	31	1,28%
Canindeyú	30	1,24%
Alto Paraguay	10	0,41%
Caazapá	10	0,41%
Caaguazú	10	0,41%
Concepción	9	0,37%
Guairá	3	0,12%
Misiones	1	0,04%
Extranjero	1	0,04%
TOTAL	2.420	100,00%


Fuente: Vigilancia de Enfermedades Vectoriales y Zoonóticas, DGVS, MSPBS.

Actualización Epidemiológica Oropouche en la Región de las Américas

Resumen de la situación. En el 2025, entre la semana epidemiológica (SE) 1 y la SE 30 se notificaron 12.786 casos confirmados de Oropouche en la Región de las Américas. Los casos confirmados se reportaron en 11 países de la Región de las Américas: Brasil (n= 11.888 casos), Canadá (n= 1 caso importado), Chile (n= 2 casos importados), Colombia (n= 26 casos), Cuba (n= 28 casos), los Estados Unidos de América (n= 1 caso importado), Guyana (n= 1 caso), Panamá (n= 501 casos), Perú (n= 330 casos), Uruguay (n= 3 casos importados) y Venezuela (República Bolivariana de)1 (n= 5 casos) (figura 1) (1 -15).

Previamente durante el 2024, se habían notificados 16.239 casos confirmados de Oropouche, incluidas cuatro defunciones en la Región de las Américas. Los casos confirmados se reportaron en 11 países y un territorio de la Región de las Américas: Barbados (n= 2 casos), el Estado Plurinacional de Bolivia (n= 356 casos), Brasil (n=13.785 casos, incluidas cuatro defunciones), Canadá (n= 2 casos importados), Colombia (n= 74 casos), Cuba (n= 626 casos), Ecuador (n= 3 casos), los Estados Unidos de América (n= 108 casos importados), Guyana (n= 3 casos), las Islas Caimán (n= 1 caso importado), Panamá (n= 16 casos) y Perú (n= 1.263 casos) (figura 1). Adicionalmente, se reportaron casos importados de Oropouche en países de la Región Europea (n= 30 casos) (16).

Figura 1. Número de casos autóctonos confirmados de Oropouche por país y semana epidemiológica (SE) de inicio de síntomas, Región de las Américas, 2024-2025



Fuente: Adaptado de los datos aportados por los respectivos países y reproducidos por la OPS/OMS (1-16).

Desde la Actualización Epidemiológica de Oropouche de la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) publicada el 11 de febrero del 2025, se notificaron 9.014 casos más confirmados de Oropouche y cinco países adicionales de la Región han presentado casos confirmados (Chile, Colombia, los Estados Unidos de América, Uruguay y Venezuela) (1-16).


Fuente: Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud. Actualización Epidemiológica Oropouche en la Región de las Américas, 13 de agosto del 2025. Washington, D.C.: OPS/OMS; 2025. Disponible en: <https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-oropouche-region-americas-13-agosto-2025>

SÍNDROME NEUROLÓGICO CON ASOCIACIÓN A VIRUS ZIKA

Desde el 29 de diciembre de 2024 (SE 1) hasta el 20 de septiembre del 2025 (SE 38), ingresaron al sistema de vigilancia 59 notificaciones de síndrome neurológico asociado a virus Zika, procedentes de los departamentos de Central, Alto Paraná, Concepción, Amambay, Asunción, Boquerón, Caazapá, Cordillera, Caaguazú, Paraguarí, Guará, Itapúa y Presidente Hayes. Como diagnóstico de ingreso predomina el Síndrome Guillain Barré (76%), el 56% es del sexo masculino. Del total de los casos, 26 son menores de 15 años.

De acuerdo a la clasificación según asociación al virus Zika, el 51% de los casos fueron descartados y el 49% se encuentran en estudio para el cierre de casos (Gráfico 17).


Gráfico 17. Notificaciones de Síndromes neurológicos asociados a virus Zika, según clasificación final y por semana epidemiológica, Paraguay, SE 1 a SE 52/2024 hasta la SE 38/2025



Fuente: Centro Nacional de Información Epidemiológica, DGVS

Al realizar un comparativo del mismo período epidemiológico desde la SE 1 a SE 38, se observa una disminución del 3% de las notificaciones del año 2025 (n=59) con relación al año 2024 (n=61) (Gráfico 18).

Gráfico 18. Comparativo de notificaciones de Síndromes neurológicos asociados a virus Zika, Paraguay, SE 1 a SE 38 de los años 2024 y 2025*




Fuente: Centro Nacional de Información Epidemiológica, DGVS.

SÍNDROME CONGÉNITO/MICROCEFALIA ASOCIADA A VIRUS ZIKA

En lo que va el año 2025 desde SE 1 a la SE 38, ingresa al sistema de vigilancia, 11 notificaciones de sospecha de Síndrome Congénito/Microcefalia asociado a virus Zika. Según procedencia son del departamento de Central, Alto Paraná, Presidente Hayes, Amambay, Asunción y Paraguarí, son 7 casos que corresponden al sexo femenino y 4 del sexo masculino.

De acuerdo a la clasificación según asociación al virus Zika, 3 casos fueron descartados y 8 sospechosos pendientes de cierre epidemiológico (Gráfico 19).

Gráfico 19. Notificaciones de Síndrome Congénito/microcefalia asociada a virus Zika, según Clasificación final y semana epidemiológica de notificación, Paraguay, SE 1 al SE 52/2024, hasta la SE 38/2025



Fuente: Centro Nacional de Información Epidemiológica, DGVS-MSPBS.


VIGILANCIA UNIVERSAL - MENINGOENCEFALITIS AGUDA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCCICA

Resumen 2024. Se registraron 791 notificaciones, de los cuales se han clasificado como Meningitis el 61% (n=482), siendo más frecuentes las compatibles con etiología viral (n=255) seguida de la bacteriana (n=167) casos. Entre los agentes virales el más frecuente fue el dengue (36%), seguido por enterovirus (25%). En cuanto a la etiología bacteriana, el más frecuentemente fue con *Streptococcus pneumoniae* (45%), seguido de *Staphylococcus aureus* (22%), *Haemophilus influenzae* (12%) y de *Neisseria meningitidis* (8,4%).

SITUACIÓN 2025

Desde la SE 1 a SE 37 del 2025 se han registrado 405 notificaciones al Sistema de Vigilancia Universal de Meningoencefalitis Aguda. La curva de tendencia se encuentra por debajo del promedio de casos esperados para las últimas tres semanas (Gráfico 20).

Gráfico 20. Casos sospechosos de Meningoencefalitis según semana epidemiológica, Vigilancia Universal, Paraguay, año 2022, 2023, 2024 y 2025(hasta la SE 37)*




* El promedio de casos esperados es de 12 casos semanales (calculado en base a los años sin brotes identificados).

Fuente: Programa de Vigilancias Especiales y Centinela DGVS – MSPBS.

Según grupos etarios, se observa mayor frecuencia en los grupos de 25 a 39 años (17%), seguido de menores de 2 años (16%) y en mayores de 60 años (14%). En general, se observa predominio del sexo masculino (66%) (Gráfico 21).


Gráfico 21. Casos sospechosos de Meningoencefalitis según grupo de edad y sexo, Vigilancia Universal, Paraguay, SE 37/2025



Fuente: Programa de Vigilancias Especiales y Centinela DGVS – MSPBS.

Se han reportado notificaciones de 16 departamentos del país, siendo la mayoría de procedencia: Central 40% (162/405), Asunción 13% (51/405), Alto Paraná 11% (46/305), Itapúa 5% (20/405), Cordillera 4% (17/405), Caaguazú 4% (16/405), San Pedro 3% (13/405), Amambay 3% (12/405) (Gráfico 22).


Gráfico 22. Casos sospechosos de Meningoencefalitis según departamento de procedencia, Vigilancia Universal, Paraguay, SE 37/2025



Fuente: Programa de Vigilancias Especiales y Centinela DGVS – MSPBS.

Fueron descartados con otros diagnósticos 116 casos (29%). Reunieron criterios de Meningitis 283 casos (70%), siendo las de probable etiología bacteriana 124 casos (44%) y las compatibles con probable etiología viral 115 casos (41%). Además, se identificó 32 casos de causa micótica (*Cryptococcus* sp), con 12 fallecidos y siete casos confirmados a *Mycobacterium tuberculosis*, con dos fallecidos, Se reporta 1 (un) caso fallecido con Enfermedad meningocócica sin meningitis bacteriana aguda (EM sin MBA) a *Neisseria meningitidis* serogrupo B (Gráfico 23).

Gráfico 23. Distribución de casos sospechosos de Meningoencefalitis y Enfermedad Meningocócica, según clasificación final, Vigilancia Universal, Paraguay, acumulado hasta SE 37/2025



*EM sin MBA: Enfermedad meningocócica sin meningitis bacteriana aguda
Fuente: Programa de Vigilancias Especiales y Centinela DGVS – MSPBS.

Meningitis Bacteriana Aguda: Se notificaron 124 (44%) probables casos de Meningitis Bacteriana Aguda, fue posible la identificación del agente causal en 87 casos (71%)

Tabla 15. Agentes causales identificados en Meningitis bacterianas. Vigilancia Universal, Paraguay, SE 1 al 37/2025

Agente causal identificado (n=87)	Frecuencia Absoluta (n)
Streptococcus pneumoniae	37
Staphylococcus aureus	18
Neisseria meningitidis*	14
Haemophilus influenzae**	6
Streptococcus pyogenes	4
Escherichia coli	2
Streptococcus β hemolítico	1
Enterococcus gallinarum	1
Estreptococcus agalactiae	1
Estreptococcus dysgalactiae	1
Klebsiella pneumoniae	1
Cocos gran positivos (CGP)	1

*Neisseria meningitidis: siete casos serogrupo C, siete casos serogrupo B.
** Haemophilus influenzae: Un caso serotipo b, dos casos no suptificados y 3 casos de serotipo no b
Fuente: Programa de Vigilancias Especiales y Centinela DGVS – MSPBS.

Mortalidad asociada a meningitis bacteriana: Se registro 26 defunciones, 10 (diez) por Staphylococcus aureus, 10 (diez) por Streptococcus pneumoniae, 2 (dos) por Streptococcus pyogenes, 2 (dos) por Neisseria meningitidis serogrupo C, 1(uno) Streptococcus β hemolítico y 1(uno) por Haemophilu influenzae serotipo no b.

Meningitis/Encefalitis Viral: Las Meningoencefalitis de probable etiología Viral notificadas fueron 115 casos (44%). Fue identificado el virus causal en 69 casos (60%), siendo el agente mayormente identificado

Enterovirus, seguidos Virus Herpes Humano 6 o 7 (HHV-6/7), Virus Epstein Bar (EBV), Herpes Simplex tipo 1 y 2 (HSV-1 y 2), Virus Varicella Zoster (VZV) y Parvovirus B19. (Tabla 16).

Tabla 16. Agentes causales identificados en Meningoencefalitis Virales. Vigilancia Universal, Paraguay, SE 1 al 37/2025

Agente causal identificado (n=69)	Frecuencia Absoluta (n)
Enterovirus	17
Virus Herpes Humano 6 o 7 (HHV-6/7)	13
Herpes Simplex tipo 1 y 2 (HSV-1 y 2)	10
Virus Epstein Bar (EBV)	9
Virus Varicella Zoster (VZV)	9
Parvovirus B19	8
Citomegalovirus (CMV)	2
Chikungunya	1

Fuente: Programa de Vigilancias Especiales y Centinela DGVS – MSPBS.

Mortalidad asociada a Meningitis/Encefalitis Viral: Se han registrado dos defunciones por probables causas viral relacionada a Herpes simplex tipo 1 y 2 (HSV-1 y 2) y Virus Epstein Bar (EBV).

Más información disponible en: <https://sistemasdgvs.mspbs.gov.py/sistemas/menin/>

OTRAS ENFERMEDADES VECTORIALES

Leishmaniasis visceral. Hasta la SE 38/2025, se registran 65 casos confirmados provenientes de los departamentos de Central (39), Concepción (9), Canindeyú (3), Amambay (3), Capital (2), Caaguazú (2), Cordillera (1), Paraguari (1), San Pedro (1), Presidente Hayes (1), Boquerón (1), Itapúa (1) y Caazapá (1). De los casos confirmados, el 74% corresponde al sexo masculino.

Leishmaniasis tegumentaria. Se registró 48 casos hasta la SE 38/2025 provenientes de los departamentos de Canindeyú (11), Central (8), San Pedro (5), Caaguazú (6), Boquerón (4), Concepción (4), Alto Paraná (1), Amambay (1), Ñeembucú (1), Paraguari (1), Pte. Hayes (1), Asunción (1), y un caso importado del Brasil.

Enfermedad de Chagas. Se reportan hasta la SE 38/2025, 178 casos de la enfermedad de Chagas, provenientes de los departamentos de Central (71), Cordillera (26), Paraguari (20), Capital (16), San Pedro (14), Itapúa (12), Guairá (3), Caazapá (3), Amambay (2), Alto Paraguay (2), Boquerón (2), Caaguazú (2), Concepción (1), Alto Paraná (1), Ñeembucú (1), Canindeyú (1), Itapúa (1) y Pte. Hayes (1).

Malaria. Se reportan hasta la SE 38/025, dos casos importados, correspondientes al sexo masculino del grupo de edad de 15 a 19 años y de 40 a 49 años, con antecedentes de viaje a Guinea Ecuatorial y Sudán del Sur, procedente del departamento de Cordillera y Central.

Fiebre amarilla. No se reportan casos en la SE 38/2025.

Tabla 17. Casos de Leishmaniasis visceral, L. tegumentaria, Chagas agudo, Chagas crónico, malaria y fiebre amarilla según departamentos, Paraguay, SE 1 a 38 del 2025

Departamentos	Leishmaniasis visceral	Leishmaniasis tegumentaria	Chagas Agudo	Chagas Crónico	Malaria	Fiebre Amarilla
Concepción	9	4	0	1	0	0
San Pedro	1	5	0	14	0	0
Cordillera	1	0	0	26	1*	0
Guairá	0	0	0	3	0	0
Caaguazú	2	6	0	2	0	0
Caazapá	1	0	0	3	0	0
Itapúa	1	0	0	12	0	0
Misiones	0	0	0	0	0	0
Paraguari	1	1	0	20	0	0
Alto Paraná	0	1	0	1	0	0
Central	39	8	0	71	1*	0
Ñeembucú	0	1	0	1	0	0
Amambay	3	1	0	2	0	0
Canindeyú	3	11	0	1	0	0
Pte. Hayes	1	1	0	1	0	0
Boquerón	1	4	0	2	0	0
Alto Paraguay	0	0	0	2	0	0
Capital	2	1	0	16	0	0
Extranjero	0	1	0	0	0	0
Sin Datos	0	3	1	0	0	0
Total	65	48	1	178	2	0

Fuente: Programa Nacional de Enfermedades Vectoriales, DGVS-MSPBS

*caso de malaria importado

ZOONÓTICAS

Hantavirus. En lo que va el 2025 hasta la SE 38/2025, se reportan ocho casos confirmados, correspondientes a los grupos de 15 a 19 años, 20 a 39 años y 40 a 49 años, uno del sexo femenino y siete del sexo masculino, procedentes del departamento de Boquerón. De los casos confirmados dos fallecidos correspondientes a la SE 25 y SE 28.

Leptospirosis. No se reportan casos en la SE 38/2025.

Tabla 18. Resumen de enfermedades zoonóticas, Paraguay, SE 1 a 38 del 2025

Departamento	Accidente Ofídico	Escorpionismo	Aracnoidismo	Brucelosis*	Rabia humana
Alto Paraguay	17	4	0	0	0
Alto Paraná	23	12	4	0	0
Amambay	8	7	0	0	0
Capital	4	116	18	0	0
Boquerón	6	0	3	0	0
Caaguazú	9	0	0	1	0
Caazapá	26	1	1	0	0
Canindeyú	20	8	0	0	0
Central	25	395	89	0	0
Concepción	31	9	0	0	0
Cordillera	20	12	5	0	0
Guairá	13	4	3	0	0
Itapúa	62	32	11	0	0
Misiones	6	17	1	0	0
Ñeembucú	14	7	1	0	0
Paraguarí	28	62	9	0	0
Pdte. Hayes	32	7	2	0	0
San Pedro	24	40	4	0	0
SD	0	0	0	0	0
Total	368	733	151	1	0

Fuente: PNCZ y CAN-DGVS.

Accidentes ponzoñosos. Desde la SE 1 hasta la SE 38 del 2025, se registraron 368 casos de accidentes ofídicos en 17/17 departamentos y la capital del país. Escorpionismo, se registran en total 733 casos y Aracnoidismo, se registran 151 casos.

Brucelosis. En la SE 38/2025, fue confirmado un caso de Brucelosis, procedente del departamento de Caaguazú, del grupo de edad de 50 a 59 años, sexo masculino.

Rabia humana. En la SE 38/2025, no se registran casos de rabia en humanos.

CASOS DE EXPOSICIÓN HUMANA A VIRUS RÁBICO

Hasta la SE 38 del 2025, se notificaron 6.445 casos de exposición humana a virus rábico, la mayoría de las consultas corresponden al Centro Antirrábico Nacional (38%), seguido del departamento de Central (22%) (Tabla 19).

Tabla 19. Casos de exposición humana a virus rábico reportados al Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional, según Regiones Sanitarias, SE 1 a 38 del 2025

Departamentos	Número	%
Concepción	50	1%
San Pedro	124	2%
Cordillera	163	3%
Guairá	124	2%
Caaguazú	8	0%
Caazapá	19	0%
Itapúa	593	9%
Misiones	103	2%
Paraguarí	328	5%
Alto Paraná	184	3%
Central	1.420	22%
Ñeembucú	66	1%
Amambay	43	1%
Canindeyú	32	0%
Presidente Hayes	90	1%
Boquerón	23	0%
Alto Paraguay	15	0%
Asunción	596	9%
Centro Antirrábico Nacional	2.464	38%
TOTAL	6.445	100%

Fuente: PNCZ y CAN-DGVS

De las personas afectadas, el predominio es del sexo masculino (54%), y según grupos de edad, la mayoría tenían entre 20 a 39 años (27%) y 5 a 14 años (25%). Según la especie animal, predomina el perro (83%) y en menor medida el gato (11%) entre otros animales. En el 92% la exposición fue por mordeduras. Según los tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional, se registran que el 99% se realizó post exposición y el 1% pre exposición.

En el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), fueron confirmados 35 casos de rabia animal de las cuales fueron de especie bovina (28), quiróptera (5), canina (1) y equina (1). Por lo cual, se realizó la investigación a 118 contactos (personas), y se vacunó a 472 personas, y 1.512 animales (1.043 caninos, 469 felinos) (Tabla 20 y Mapa 2).

Tabla 20. Investigaciones e Intervenciones realizadas en relación a focos de rabia animal, Paraguay, acumulado, SE 1 a 38 del 2025

N° caso	Departamentos	Distrito	Especie animal	Intervención humana		Intervención animal		
				N° contactos	N° vacunas	N° Caninos	N° Felinos	N° vacunados
1	PRESIDENTE HAYES	Benjamín Aceval	CANINA	29	116	503	189	692
2	ITAPUA	Natalio	BOVINA	9	36	10	0	10
3	CENTRAL	Luque	QUIROPTERA	6	24	26	23	49
4	ITAPUA	Yataity	BOVINA	4	16	13	1	14
5	PARAGUARI	Caapucú	BOVINA	4	16	18	9	27
6	BOQUERON	Mariscal Estigarribia	BOVINA	2	8	0	0	0
7	PARAGUARI	Ybytymi	QUIROPTERA	0	0	0	0	0
8	AMAMBAY	Bella Vista Norte. San Pedro	BOVINA	3	12	0	0	0
9	AMAMBAY	Bella Vista Norte. San Isidro	BOVINA	1	4	0	0	0
10	CORDILLERA	Eusebio Ayala	BOVINA	4	16	41	1	42
11	CORDILLERA	Eusebio Ayala	BOVINA	0	0	0	0	0
12	PRESIDENTE HAYES	Puerto Falcón	BOVINA	10	40	57	43	100
13	CAPITAL	Asunción	QUIROPTERA	1	4	42	18	60
14	ALTO PARAGUAY	Carmelo Peralta	EQUINA	4	16	0	0	0
15	ITAPUA	Yatytay	BOVINA	2	8	13	1	14
16	ALTO PARAGUAY	Puerto Casado	BOVINA	3	12	0	0	0
17	MISIONES	Santa Rosa	BOVINA	6	24	42	8	50
18	PARAGUARI	Caapucú	BOVINA	0	0	0	0	0
19	CONCEPCION	Yby Yaú	BOVINA	1	4	24	6	30
20	CAPITAL	Asunción	QUIROPTERA	1	4	24	6	30
21	CONCEPCION	Paso Barreto	BOVINA	2	8	8	27	35
22	CONCEPCION	Loreto	BOVINA	2	8	16	14	30
23	CENTRAL	San Lorenzo	QUIROPTERA	0	0	42	8	50
24	ÑEEMBUCU	Villa Oliva	BOVINA	4	16	0	0	0
25	SAN PEDRO	Guayaibi	BOVINA	0	0	0	0	0
26	CONCEPCION	Loreto	BOVINA	0	0	21	9	30
27	SAN PEDRO	San Pedro de Ycuamandjú	BOVINA	0	0	0	0	0
28	MISIONES	Santa Rosa	BOVINA	6	24	0	0	0
29	PRESIDENTE HAYES	José Falcón	BOVINA	5	20	22	15	37
30	PRESIDENTE HAYES	Nanawa	BOVINA	2	8	32	28	60
31	ÑEEMBUCÚ	Mayor Martínez	BOVINA	2	8	15	17	32
32	ÑEEMBUCÚ	Guazú Cuá	BOVINA	3	12	0	0	0
33	ÑEEMBUCÚ	Villalbin	BOVINA	0	0	36	19	55
34	ÑEEMBUCÚ	Desmochados	BOVINA	0	0	38	27	65
35	ÑEEMBUCÚ	Villalbin	BOVINA	2	8	0	0	0
TOTAL				118	472	1043	469	1512

Fuente: PNCZ y CAN-DGVS.

Mapa 2. Casos de rabia animal en Paraguay, SE 1 a 38 del 2025



Fuente: PNCZ y CAN-DGVS.

ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNAS

BROTE DE SARAMPION

Antecedentes. En Paraguay los últimos casos endémicos de sarampión se registraron en el año 1998. En el 2015, el país fue certificado como libre sarampión, logrando sostener la eliminación luego de la certificación.


Situación actual

El 4 de agosto del 2025 el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, confirmó un caso de sarampión.¹ El caso fue notificado como sospechoso el 02 de agosto, corresponde a un niño de 5 años, sin antecedente de vacunación contra el sarampión, residente en el distrito de Santa Rosa de Aguaray del departamento de San Pedro, con antecedente de contacto con caso con síntomas de sarampión procedente de otro país donde en la actualidad se registran brotes activos de sarampión. Ante la detección de este evento, se activó de inmediato el Equipo de Respuesta Rápida a nivel nacional para la implementación de medidas de control y contención del brote, y se emitió la alerta Epidemiológica N° 04/2025. Posterior a la notificación del caso índice del brote, la Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS) ha realizado actualizaciones semanales de la situación.²

Según reporte de la actualización Epidemiológica del Brote de Sarampión³, según fecha de inicio de síntomas a la SE 38, se registran 44 casos confirmados de sarampión, 16 sospechas en estudio y seguimiento y 74 descartados. En este reporte se incluye un caso confirmado nuevo procedente del Departamento Central, distrito de Fernando de la Mora, paciente adulto sin antecedente de vacunación.

Según procedencia 43 casos confirmados corresponde al departamento de San Pedro de los distritos de Tacuatí (21), Nueva Germania (14) y Santa Rosa de Aguaray (8) y 1 caso al departamento de Central del distrito de Fdo. de la Mora.

Distribución de casos confirmados de sarampión por fecha de inicio de exantema, Paraguay 2025* (N= 44)



CARACTERÍSTICAS DE LOS CASOS CONFIRMADOS

El 61% (27/44) de los casos son del sexo femenino, rango de edad 3 meses a 54 años, principalmente en el grupo de 1 a 4 años.

Desde el inicio del brote 7 requirieron hospitalización todos procedentes de San Pedro. A la fecha todos con alta médica. Ningún caso requirió cuidados intensivos. No se registraron fallecidos

ACTIVIDADES REALIZADAS

Departamento de San Pedro, desde el 03 de agosto a la fecha continúan todas las acciones de control y respuesta. En San Pedro de enero a setiembre (parcial) fueron aplicadas 19,968 dosis con un aumento de 61,7% (12.333/19.968) en los últimos dos meses.

Departamento Central. Desde el domingo 21 de septiembre se activaron los Equipos de Respuesta Rápida para la investigación e identificación de nuevos casos y sus contactos, así como la implementación de medidas de control en los lugares afectados del área metropolitana.

Hasta el momento Paraguay mantiene su estatus de país libre de sarampión gracias al cumplimiento sostenido de los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Este reconocimiento se respalda en la ausencia de transmisión endémica del virus, la existencia de un sistema de vigilancia epidemiológica sensible y mejoras en la cobertura de vacunación con dos dosis de la vacuna SPR en la población objetivo.

VIGILANCIA DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES POR VACUNA

Hasta la SE 38 del 2025 en el país, no se han confirmado ningún caso de: rubéola, síndrome de rubéola congénita, poliomielitis, difteria y tétanos neonatal.

Vigilancia de las Parálisis Flácida Aguda en ≤ 15 años (PFA) para poliomielitis: Hasta la SE 38 se han notificados 24 casos, 17 fueron descartados por laboratorio y tres con ausencia de parálisis residual a los 60 días quedando también cuatro casos pendientes de cierre.

Vigilancia de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) para sarampión/rubéola: Hasta la SE 38 se han notificado 1197 casos sospechosos de sarampión y rubéola de los cuales 1003 (84%) fueron descartados por laboratorio y/o criterio clínico epidemiológico.

Síndrome de Rubéola Congénita (SRC): Hasta la SE 38 se notificaron seis casos sospechosos que fueron descartados en su totalidad.

Difteria: Hasta la SE 38 se han notificado cuatro casos sospechosos, todos han sido descartados por laboratorio.

Coqueluche: Hasta la SE 38 se han notificado 159 casos sospechosos, de los cuales 60 han sido confirmados: 56 mediante análisis de laboratorio y cuatro por nexo epidemiológico. Asimismo, 83 casos fueron descartados y 16 se encuentran en investigación. Entre los casos confirmados, se registraron sei fallecimientos, todos menores de un año; dos residentes en el departamento Central, uno de San Pedro, uno de Amambay, Concepción y Pdte. Hayes. Los demás pacientes han evolucionado favorablemente.

Parotiditis: Hasta la SE 38 se han notificado 354 casos confirmados por clínica. Al cierre del presente informe no se reportaron brotes.

Tétanos Neonatal (TNN): Hasta la SE 38 se notificaron dos casos sospechosos que se encuentran en investigación.

Tétanos en Otras Edades (TOE): Hasta la SE 38 se ha notificado ocho casos sospechosos dos fueron confirmados, uno del sexo masculino residente en el departamento Central y otra del sexo femenino residente en el departamento de Concepción y seis pendientes de cierre.

Varicela: Hasta la SE 38 se han notificado 1746 casos confirmados por clínica. Se reportaron brotes institucionales actualmente activos en los departamentos de Caaguazú, Itapúa, Paraguari, Central, Pdte. Hayes, Boquerón y Capital.

Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI): Hasta la SE 38 se notificaron 123 casos de ESAVI por vacunas del esquema regular, el 52% (65) de los casos se encuentran clasificados como No Graves. No se incluyen ESAVI por vacuna COVID 19.

Tabla 22. Notificación de casos sospechosos de enfermedades prevenibles por Vacunación y ESAVI, por regiones sanitarias, Paraguay, SE 1 a 38/2025

REGION SANITARIA	PFA			EFE**			SRC			DIFTERIA			COQUELUCHE			PAROTIDITIS		TNN			TOE			VARICELA		ESAVI
	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Conf.	Notif.
Concepción	3	1	0	34	30	0	1	...	1	8	8	1	0	0	1	0	1	47	47	2
S. Pedro N.	117	64	43	4	1	3	5	5	49	49	2
S. Pedro S.	29	27	0	4	4	31	31	..
Cordillera	1	1	0	80	73	0	1	1	0	9	9	58	58	2
Guairá	31	30	0	1	0	1	8	8	63	63	1
Caaguazú	1	0	0	37	29	0	7	3	2	8	8	59	59	...
Caazapá	1	1	0	19	16	0	1	1	0	9	9	1	0	0	45	45	5
Itapúa	3	3	0	115	108	0	2	2	0	12	11	0	32	32	146	146	10
Misiones	9	8	0	3	3	0	6	6	23	23	...
Paraguari	1	1	0	55	51	0	5	0	3	15	15	123	123	7
A. Paraná	1	1	0	84	71	0	3	3	0	24	16	8	22	22	2	0	0	92	92	5
Central	6	5	0	320	267	1	3	3	0	1	1	0	58	24	27	163	163	3	0	1	681	681	54
Ñeembucú	41	32	0	2	1	0	7	7	41	41	...
Amambay	3	3	0	24	20	0	3	2	1	5	5	18	18	3
Canindeyú	27	22	0	1	1	0	5	5	26	26	...
Pdte. Hayes	2	2	0	73	64	0	7	4	2	15	15	1	0	0	51	51	7
Boquerón	1	1	0	6	6	0	3	3	0	18	18	...
A. Paraguay	3	3	0	1	1	0	1	1	1	1	1	...
Asunción	1	1	0	93	82	0	25	12	12	32	32	1	0	0	174	174	25
Total, País	24	20	0	1197	1003	44	6	6	0	4	4	0	159	83	60	354	354	2	0	0	8	0	2	1746	1746	123

Notif: Casos sospechosos notificados de la SE del 1 a la 38- 2025. ... No se notificó casos sospechosos

Fuente: Programa Ampliado de Inmunizaciones

En la tabla 23, se presentan los indicadores de vigilancia del sarampión/rubéola y de la poliomielitis; el porcentaje mínimo requerido es de 80% por indicador.

Indicador de unidades que notifican semanalmente: Entre la SE 1 al 37 el país cuenta con 1.491 unidades notificadoras; con un cumplimiento del 99,4%.

Se recuerda a las regiones realizar el control de calidad de las notificaciones; debe coincidir el número de casos notificados en la planilla de Enfermedad de Notificación Obligatoria con el número de casos notificados por ficha epidemiológica individual.

Indicadores de Vigilancia del Sarampión/Rubéola: Hasta la SE 38 el país cumple con todos los indicadores de la Vigilancia.

Indicadores de Vigilancia de la PFA para Poliomieltitis: Hasta la SE 38 el país cumple con los indicadores de investigación adecuada y muestra adecuada.

Tabla 23. Indicadores de Vigilancia comparativo entre 2024 y 2025, Paraguay SE 1 a 38 del 2025

REGION SANITARIA	SARAMPIÓN / RUBÉOLA											POLIOMIELITIS								
	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Casos con muest adec		% Muest lleg. Al lab <= 5 días		% Resul lab <=4 días		Tasa*		% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Muest. Adec		Tasa**	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Concepción	98	98	86	91	100	100	93	97	93	100	6.63	13.73	100	98	100	100	100	67	3.19	4.84
S. Pedro N	100	100	70	94	91	93	40	92	78	72	6.31	50.41	100	100	100	...	0	...	1.83	0.00
S. Pedro S	100	99	100	97	100	100	91	100	98	86	6.66	14.19	100	99	100	...	100	...	1.98	0.00
Cordillera	100	100	81	90	98	100	98	96	91	95	17.22	30.64	100	100	100	100	100	100	4.43	1.53
Guairá	100	100	89	94	92	100	97	87	91	97	19.53	18.31	100	100	100	...	100	...	2.23	0.00
Caaguazú	100	100	96	62	96	97	88	75	88	100	5.87	7.29	100	100	...	100	...	0	0.00	0.79
Caazapá	100	98	80	89	100	100	60	89	100	100	3.48	12.25	100	99	...	100	...	100	0.00	2.57
Itapúa	100	100	78	94	100	100	99	93	93	96	18.54	26.49	100	100	100	100	100	100	2.59	2.76
Misiones	100	98	57	89	83	100	54	100	92	100	25.46	8.07	97	99	100	...	100	...	3.47	0.00
Paraguarí	100	100	94	96	94	100	97	94	90	94	50.61	33.58	100	100	100	100	100	100	2.14	2.44
A. Paraná	98	99	88	93	97	95	55	88	87	99	3.98	10.02	99	99	100	100	100	100	0.93	0.48
Central	100	100	74	82	87	96	82	93	89	97	13.62	16.40	100	100	86	83	86	83	1.48	1.23
Ñeembucú	100	100	87	88	98	93	91	92	93	97	95.08	82.76	100	100	0.00	0.00
Amambay	100	100	100	100	100	96	80	86	100	95	5.71	13.86	100	100	...	100	...	67	0.00	6.92
Canindeyú	99	89	73	81	100	96	91	84	73	92	5.71	11.88	95	90	100	...	100	...	1.70	0.00
Pdte. Hayes	100	100	83	84	91	93	64	76	95	100	17.73	50.81	100	100	...	100	...	100	0.00	5.56
Boquerón	100	100	100	100	100	100	100	66	100	100	5.54	5.51	100	100	...	100	...	100	0.00	3.66
A. Paraguay	100	100	100	67	100	100	67	100	100	100	16.58	13.75	100	100	0.00	0.00
Asunción	100	97	97	93	97	98	100	95	84	98	6.70	22.30	99	97	100	100	100	100	1.00	0.96
Total, País	100	99	82	88	93	96	86	91	90	98	13.19	18.65	99	99	96	96	92	92	1.48	1.49

*Cumplimiento de tasa de EFE
 ** Cumplimiento de tasa de PFA
 ... No se notificó caso sospechoso

Último caso registrado de Sarampión SE 37 del 2022, de Rubéola en 2005 y de SRC en 2003
 Último caso registrado de Poliomieltitis en 1985.

Fuente: Programa Ampliado de Inmunizaciones

RECORDATORIO

Enfermedades Febriles Eruptivas: El Sarampión, enfermedad viral, altamente contagiosa se presenta con un pródromo de dos a tres días de fiebre, malestar, tos y escurrimiento nasal (coriza) que suele estar acompañado de conjuntivitis y una erupción maculopapular. Teniendo en cuenta la **Alerta Epidemiológica N°4 del 2025** riesgo de dispersión de sarampión en el país, ante casos confirmados relacionados a importación, se recuerda a los profesionales de la salud la importancia de identificar y notificar los casos sospechosos en forma oportuna, tomar muestra de suero, hisopado y orina.

Definición de caso: caso sospechoso: Toda persona de cualquier edad en quien se sospeche Sarampión o Rubéola o que presente fiebre y exantema maculopapular.

Caso confirmado por laboratorio: es un caso sospechoso de sarampión en el que se demuestra esta etiología por IgM positivo, seroconversión de IgG en muestras pareadas, PCR positiva.

Caso confirmado por nexo epidemiológico: caso sospechoso con nexo epidemiológico con otro caso confirmado por laboratorio.

Caso importado de sarampión: un caso confirmado en una persona que viajó a otro país donde circulaba el virus del sarampión durante el periodo de posible exposición (entre 7 y 21 días antes de la aparición de la erupción); y un residente nacional confirmado que no viajó pero que fue infectado por un virus importado (se puede o no conocer la fuente).

Alerta Epidemiológica disponible en: *Riesgo de Dispersión de Sarampión en el país, ante casos confirmados relacionados a importación* https://dgvs.mspbs.gov.py/wp-content/uploads/2025/08/Alerta_Epidemiologica_Nro.4-2025-Sarampion_final.pdf

Mas información sobre sarampión disponible en: <https://dgvs.mspbs.gov.py/sarampion/>




https://dgvs.mspbs.gov.py/wp-content/uploads/2025/09/WEB-Sarampion-Paraguay_SE_39_26_09_2025_-1.pdf

ACTUALIZACIÓN EPIDEMIOLOGICA SARAMPIÓN EN LAS REGIONES– SE37/2025

En 2025, entre la semana epidemiológica (SE) 1 y la SE 37, en la Región de las Américas, 11.313 casos de sarampión han sido confirmados, incluyendo 23 defunciones, en Argentina (n= 35), el Estado Plurinacional de Bolivia (n= 320 casos), Brasil (n= 28 casos), Costa Rica (n= 1 caso), los Estados Unidos de América (n= 1.454, incluyendo tres defunciones), México (n= 4.553 casos, incluyendo 19 defunciones), Paraguay (n=35 casos en la semana 37) y Perú (n= 4 casos) (Figura 2) (2-13). Este total representa un aumento de 31 veces en comparación con los 358 casos de sarampión notificados en el mismo periodo del 2024 (14).

Figura 2. Casos confirmados* de sarampión por semana epidemiológica de inicio de exantema o de notificación y país en la Región de las Américas, 2025 (hasta la SE 37)



*Nota: Incluye casos confirmados y probables para Canadá.

Fuente: Adaptado de datos aportados por los respectivos países (2-13).

Argentina: entre la SE 1 y la SE 37 del 2025, se han confirmado 35 casos de sarampión, los casos confirmados fueron reportados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) (n= 13 casos), las provincias de Buenos Aires (n= 21 casos) y San Luis (n= 1 caso). Seis de los casos son importados, 29 relacionados con la importación y cuatro confirmados con fuente de infección en estudio (2). Los casos se distribuyen en un rango de edad de 5 meses a 40 años, el 48% (n= 17) de los casos corresponden a niños menores de 5 años, el 20% (n= 7) a personas de entre 5 y 19 años y el 31% (n= 11) a adultos mayores de 20 años. La tasa incidencia por grupo de edad muestra que el grupo de edad más afectado es el de menores de un año (5,6 casos por 100.000 habitantes), seguido por el grupo de 1 a menores de 5 años (4,7 casos por 100.000 habitantes).

Bolivia: entre la SE 16 y la SE 37 del 2025, se han confirmado 320 casos de sarampión, en ocho departamentos. Los casos confirmados fueron reportados en los departamentos de Beni (n= 5), Chuquisaca (n= 5), Cochabamba (n= 7), La Paz (n= 18), Oruro (n= 7), Pando (n= 1), Potosí (n= 6) y Santa Cruz (n= 271) con el 85% de los casos (4). Del total de casos, el 25% 5 Organización Panamericana de la Salud • www.paho.org • © OPS/OMS, 2025 corresponde a niños de entre 5 y 9 años (n= 79), seguido por el grupo de 1 a 4 años con el 22% de los casos (n= 71) y el grupo de mayores de 20 años con el 20% de los casos (n= 64) (4).

Brasil: entre la SE 1 y la SE 37 del 2025, se han confirmado 28 casos de sarampión, en el Distrito Federal y cinco estados del país. Del total de casos, seis corresponden a casos importados, 19 a relacionados con la importación y tres con fuente de infección desconocida. Los casos confirmados fueron reportados en el

Distrito Federal (n= 1) y en los estados de Maranhão (n= 1), Rio de Janeiro (n= 2), São Paulo (n= 1), Rio Grande do Sul (n= 1) y Tocantins (n= 22 casos) (5). Los casos se distribuyen en los siguientes grupos etáreos: el 25% (n= 7) de los casos corresponden a niños menores de 5 años, el 21% (n= 6) a personas de entre 5 y 19 años y el 54% (n= 15) a adultos mayores de 20 años. La tasa incidencia por grupo de edad muestra que el grupo de edad más afectado es el de menores de 5 años (0,054 casos por 100.000 habitantes), seguido por el grupo de 5 a 19 años (0,014 por 100.000 habitantes) y el grupo de mayores de 20 años (0,010 por 100.000 habitantes).

Costa Rica: entre la SE 1 y la SE 24 del 2025, se ha confirmado un caso importado de sarampión en la provincia de Guanacaste. Se trata de una mujer de 18 años que ingresó al país el 3 de mayo del 2025 proveniente de Canadá. El caso no tenía antecedente de vacunación. La paciente inició síntomas el 11 de mayo con fiebre y malestar general, presentando exantema el 12 de mayo. Fue hospitalizada el 13 de mayo como medida de precaución, sin que desarrollara complicaciones asociadas a la enfermedad. El caso fue confirmado por RT-PCR el 15 de mayo por el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA). No se han registrado casos secundarios, ni defunciones.

Estados Unidos: entre la SE 1 y la SE 37 del 2025, se han notificado 1.454 casos confirmados de sarampión, incluyendo tres defunciones. De ellos, 1.433 casos de sarampión fueron notificados por 42 jurisdicciones, El 28% (n= 404) de los casos corresponde a niños menores de 5 años, el 38% (n= 554) en personas de entre 5 y 19 años, el 34% (n= 489) a adultos mayores de 20 años y el 0% (n= 7) a personas de edad desconocida. La tasa de incidencia por grupo de edad muestra que el grupo de edad más afectado es el de los niños menores de un año (3,0 casos por 100.000 habitantes), seguido del grupo de edad de 1 a menos de 5 años (1,9 por cada 100.000 habitantes).

México: entre la SE 1 y la SE 37 del 2025, se han confirmado 4.553 casos de sarampión, incluyendo 19 defunciones, en 23 estados, De los casos confirmados, el 52% son mujeres (n= 2.367). El grupo de edad más afectado fue el de 0 a 4 años con un 24% (n= 1.109), seguido del grupo de 25 a 29 años con un 13% (n= 586). La tasa incidencia por grupo de edad muestra que el grupo de edad más afectado es el de 0 a 4 años (10,6 casos por 100.000 habitantes), seguido por el grupo de 25 a 29 años (5,5 casos por 100.000 habitantes) (11). En cuanto al antecedente de vacunación de los casos, de los 4.353 casos con información, el 84% (n= 3.591) no contaba con antecedente de vacunación, el 4,5% (n= 190) tenía una dosis de SRP y el 4,5% (n= 190) contaba con dos o más dosis de SRP documentadas en la cartilla nacional de vacunación (20).


Fuente: Actualización Epidemiológica sobre Sarampión en la Región de las Américas, publicada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el 19 de septiembre de 2025. <https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-sarampion-region-americas-19-septiembre-2025>

MONITOREO DE LAS NOTIFICACIONES DE EVENTOS DE NOTIFICACIONES OBLIGATORIAS (ENO)

Cumplimiento de notificación, es el indicador de la proporción de unidades que notifican semanalmente los eventos o enfermedades de notificación obligatoria (ENO) según Planilla Semanal, por regiones sanitarias.


En la SE 38 del 2025, el 99,6% (1.485/1.491) unidades o servicios de salud cumplieron con este indicador. Cabe mencionar que, del total que notificaron el 100% lo realizó en forma oportuna (Gráfico 30 y Mapa 3).

Gráfico 30. Porcentaje de cumplimiento de las Unidades Notificadoras de Planilla Semanal de ENO según Regiones Sanitarias, Paraguay, SE 1 a 38 del 2025



Fuente: VENOCD-DGVS

Mapa 3. Cumplimiento de las Unidades Notificantes de Planilla Semanal de ENO según Regiones Sanitarias, Paraguay, SE 38 del 2025




Fuente: VENOCD-DGVS

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDA)

Según datos de la notificación por planilla semanal de Eventos de Notificación Obligatoria (ENO), en la SE 38/2025 se registraron 5.005 casos de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) a nivel nacional, sin variación con respecto a la semana anterior (SE 37=4.689). El aumento se registra en 15/18 Regiones Sanitarias (Tabla 24). La tendencia a nivel nacional se encuentra en la franja de alerta (Gráfico 31).

Gráfico 31. Canal endémico de EDA en población total según semana epidemiológica, Paraguay, SE 38 del 2025



Fuente: Planilla Semanal De Enfermedades O Eventos De Notificación Obligatoria (PSENO)

Tabla 24. Enfermedades Diarreicas Agudas por Regiones Sanitarias, últimas ocho semanas, Paraguay SE 31 a SE 38 del 2025


Región Sanitaria	SE 31	SE 32	SE 33	SE 34	SE 35	SE 36	SE 37	SE 38	Variación últimas 2 semanas (%)
CONCEPCION	113	100	98	118	89	87	119	134	13
SAN PEDRO NORTE	97	94	87	96	89	82	121	116	-4
SAN PEDRO SUR	62	74	56	82	58	57	72	76	6
CORDILLERA	79	86	95	114	100	98	95	119	25
GUAIRA	141	115	134	125	152	122	151	155	3
CAAGUAZU	145	103	113	151	108	107	134	164	22
CAAZAPA	46	50	78	102	88	72	73	93	27
ITAPUA	388	365	375	418	396	394	430	427	-1
MISIONES	95	70	75	105	92	97	84	111	32
PARAGUARI	111	97	84	124	92	106	119	127	7
ALTO PARANA	257	278	295	375	333	357	403	426	6
CENTRAL	999	951	989	1131	1110	1205	1290	1453	13
ÑEEMBUCU	75	55	42	68	89	85	75	85	13
AMAMBAY	33	33	41	37	36	25	44	74	68
CANINDEYU	89	90	93	109	105	111	115	113	-2
PTE. HAYES	108	123	120	148	124	105	145	173	19
BOQUERON	79	82	83	64	67	78	72	81	13
ALTO PARAGUAY	31	18	29	19	31	53	36	49	36
CAPITAL	879	805	845	1017	954	1147	1111	1029	-7
TOTAL PAIS	3827	3589	3732	4403	4113	4388	4689	5005	7
VARIACION PORCENTUAL	-0,2	-6	4	18	-7	7	7	7	

Fuente: Planilla Semanal De Enfermedades O Eventos De Notificación Obligatoria (PSENO)

CONJUNTIVITIS

En lo que va el 2025, se observa un aumento de casos de conjuntivitis en relación a la tendencia de casos de años anteriores (2022 al 2024). En la SE 38/2025 se registraron 283 casos (Gráfico 32).

Gráfico 32. Tendencia de casos de conjuntivitis según semana epidemiológica, Paraguay, años 2022 a SE 38 del 2025




Fuente: VENOCD-DGVS

INFORME ESPECIAL

VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS

Desde la SE 1 (Del 29/12/2024 al 04/01/2025) hasta la SE 37 (Del 13/09/2025 se reportan 181 notificaciones de los cuales 102 corresponden a casos confirmados, 77 descartados y 2 casos sospechosos, 14 brotes investigados con 59 afectados, entre las SE 6 y SE 10, se observa un aumento en el número de casos. Agente causal identificados en muestras biológicas(heces) durante los brotes y casos individuales, con predominio de *Escherichia Coli*, *Shigella spp* y *Salmonella spp* (Gráfico 33).

Gráfico 33. Curva de notificaciones por enfermedades transmitidas por agua y alimentos, según fecha de inicio de síntomas por semana epidemiológica, SE 1 a la SE 37, Paraguay, 2025.



Fuente: Programa Nacional de Enfermedades Transmitidas por Agua y Alimentos

La población afectada por grupo de edad, el 25 % (25/102) corresponde al grupo de 0-4 años, seguido con un 18% (18/102) por el grupo de 25-29 años de edad con un se registra un predominio del sexo femenino con un 61% (62/102). La tasa de incidencia es de 2 casos por 100.000 habitantes, el resultado indica que el evento tiene una frecuencia baja en la población (Tabla 26).


Tabla 25. Número de casos individuales, brotes y afectados por enfermedades transmitidas por agua y alimentos, por Regiones Sanitarias, SE 1 a la SE 37, Paraguay, 2025

Regiones	Casos individuales	N° de Brotes	N° Afectados en brotes	Total, de casos
Concepción	0	0	0	0
San Pedro Norte	0	0	0	0
San Pedro Sur	0	0	0	0
Cordillera	1	0	0	1
Guairá	2	0	0	2
Caaguazú	0	0	0	0
Caazapá	1	0	0	1
Itapúa	0	0	0	0
Misiones	0	0	0	0
Paraguarí	1	0	0	1
Alto Paraná	0	1	2	2
Central	19	5	23	42
Ñeembucú	0	3	11	11
Amambay	0	0	0	0
Canindeyú	0	0	0	0
Pdte. Hayes	5	1	2	7
Boquerón	0	0	0	0
Alto Paraguay	0	0	0	0
Capital	14	4	21	35
TOTAL	43	14	59	102

Fuente: Programa Nacional de Enfermedades Transmitidas por Agua y Alimentos - DGVS- MSPBS

Tabla 26. Casos de enfermedades transmitidas por agua y alimentos, según grupo de edad y sexo, SE 1 a la SE 37, Paraguay, 2025.

Grupos etario	F	M	Total, General
0 - 4	13	12	25
5-9	8	2	10
10 - 14	1	2	3
15 - 19	0	6	6
20 - 24	6	3	9
25 - 29	12	6	18
30 - 34	6	4	10
35 -39	1	2	3
40 - 44	6	0	6
45 - 49	1	0	1
50 - 54	0	1	1
55 - 59	2	1	3
60 - 64	1	1	2
65 - 69	1	0	1
70 - 74	0	0	0
75 - 79	1	0	1
80 +	3	0	3
Total	62	40	102




Fuente: Programa Nacional de Enfermedades Transmitidas por Agua y Alimentos -DGVS- MSP

Vigilancia laboratorial

La vigilancia laboratorial de patógenos entéricos es llevada a cabo por el Laboratorio Central de Salud Pública (LCSP) como laboratorio de referencia Nacional es la Institución encargada de la caracterización de patógenos transmitidos por agua y alimentos.

En el año 2025 de enero a junio, de 690 muestras procesadas 519 fueron negativo, se aislaron 171 microorganismos, con predominio de Escherichia Coli con un 23% (161/690), seguido con un 1% (10/690) para Salmonella en la vigilancia laboratorial de EDA.

Gráfico 34. Enteropatógenos detectados por la vigilancia laboratorial, Paraguay, enero a junio del 2025.



Fuente: Departamento de Bacteriología y Micología, sección Enteropatógenos (LCSP)

Elaboración: Programa Nacional de Enfermedades Transmitidas por Agua y Alimentos (PNETAYA)

VIRUELA SÍMICA (MPOX)

Antecedente

El 23 de julio de 2022, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de viruela del mono (Monkeypox) una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII). El 11 de mayo del 2023 la OMS declaró el fin de la emergencia por viruela símica. Desde entonces esta enfermedad se vigila como un evento de notificación obligatoria.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 14 de agosto de 2024 una nueva emergencia sanitaria mundial por el brote de viruela símica (Mpox). Esta decisión se basa en el aumento de casos en África, especialmente en la República Democrática del Congo, y la detección de una nueva variante. Alertó previamente sobre la circulación de esta nueva variante en la región, asociada a una mayor transmisión y casos en diversos grupos de edad, incluyendo niños.

Actualización

Culminación de la ESPII relacionada al Mpox

El 04 de setiembre de 2025, tras la quinta reunión del Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), se decide la culminación de la Emergencia de Salud Pública de importancia internacional ESPII relacionada a este brote.

Resumen

Desde el inicio de la Vigilancia de Mpox en el país a la fecha, se han reportado 130 casos de la enfermedad: 2022 (53 casos), 2023 (73 casos), 2024 sin casos (66 notificaciones todas descartadas) y 2025 (4 casos). (Tabla 27).

Tabla 27. Datos Acumulados de notificaciones de MPOX, Paraguay, año 2022 hasta la SE 38* del 2025

Clasificación	Año 2022 (mayo)	Año 2023 (SE 1 a SE 53)	Año 2024 (SE 1 a SE 52)	Año 2025 (SE 1 a SE 38*)	Totales
Confirmados	53	73	0	4	130
Sospechosos	0	0	0	0	0
Descartados	142	125	66	20	353

* Datos parciales

Fuente: Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública. DGVS


Situación Actual

En lo que va del año, se registraron un total de 24 notificaciones al sistema de Vigilancia de viruela símica, Mpox de los cuales fueron clasificados de la siguiente manera:

- 20 descartados, procedentes de Alto Paraná, Asunción, Central, Amambay, Cordillera, Itapúa, San Pedro y Caazapá.
- Se han confirmado cuatro casos de la enfermedad en área metropolitana: Asunción (SE 14), Lambaré (SE 15), J.A. Saldívar (SE 18) y Mariano Roque Alonso (SE 20) distritos del Departamento Central. El Laboratorio de Referencia Nacional ha identificado que los cuatro casos pertenecen al Clado II de la enfermedad. Ninguno de los pacientes requirió hospitalización. No se han registrado fallecidos relacionados con esta enfermedad.

- Para esta semana epidemiológica, no se cuentan con casos sospechosos de Mpox.
- Desde el inicio de la Vigilancia de Mpox en el país a la fecha, se han reportado 130 casos de la enfermedad: 2022 (53 casos), 2023 (73 casos), 2024 sin casos (66 notificaciones todas descartadas) y 2025 (4 casos).

Gráfico 35. Curva de notificaciones de Viruela Símica según clasificación final y semana de notificación, Paraguay, SE 1 al 52/2024 hasta la SE 38* del 2025



* Datos parciales
 Fuente: Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública. DGVS

Tabla 28. Notificaciones de Viruela Símica, datos acumulados según clasificación final y departamento de residencia SE 1 a SE 38 del 2025

REGIÓN SANITARIA	CONFIRMADOS	SOSPECHOSOS	DESCARTADOS
Asunción	1	0	4
Concepción	0	0	0
San Pedro	0	0	4
Cordillera	0	0	1
Guaira	0	0	0
Caaguazú	0	0	0
Caazapá	0	0	1
Itapúa	0	0	1
Misiones	0	0	0
Paraguarí	0	0	0
Alto Paraná	0	0	1
Central	3	0	6
Ñeembucú	0	0	0
Amambay	0	0	1
Canindeyú	0	0	0
Pte. Hayes	0	0	0
Boquerón	0	0	0
Alto Paraguay	0	0	0
Total, general	4	0	20

Fuente: Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública. DGVS.

Mapa 4. Notificaciones de viruela símica según procedencia, Paraguay, SE 1 al 38 del 2025



Fuente: <https://dgvs.mspbs.gov.py/monkeypoxparaguay/>

A partir de la declaración de ESPII, la información de la Vigilancia relacionada a Mpox se actualiza una vez por semana hasta tanto dure la emergencia, y se encuentra disponible en el siguiente enlace:

<https://dgvs.mspbs.gov.py/monkeypoxparaguay/>

REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL

El Centro Nacional de Enlace (CNE) para el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) es el punto de contacto designado por cada Estado Parte para asegurar una comunicación constante (24/7/365) con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Su función principal es facilitar el intercambio de información sobre eventos de salud pública y posibles amenazas.

En Paraguay, el CNE para el RSI opera desde 2006 en la Dirección General de Vigilancia de la Salud, específicamente con el equipo operativo de la Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. La comunicación continua se mantiene a través de diversas vías, incluyendo portales de sitios públicos:

PAHO - CORREOS DESDE EL PUNTO FOCAL, ALERTAS, NOTAS TECNICAS, ACTUALIZACIONES

1-Actualización en el sitio de Brotes Epidémicos de la OMS

Infección por el virus de Nipah – Bangladesh

<https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2025-DON582>

2-Actualización epidemiológica

Sarampión en la Región de las Américas

<https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-sarampion-region-americas-19-septiembre-2025>

CALENDARIO EPIDEMIOLÓGICO



PARAGUÁI
TESÁI HA TEKÓ
PORÁVE
MOTENONDEHA



CALENDARIO DE SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS - AÑO 2025					
Nº DE SEMANA	DESDE	HASTA	N.º DE SEMANA	DESDE	HASTA
1	29/12/2024	4/1/2025	27	29/6/2025	5/7/2025
2	5/1/2025	11/1/2025	28	6/7/2025	12/7/2025
3	12/1/2025	18/1/2025	29	13/7/2025	19/7/2025
4	19/1/2025	25/1/2025	30	20/7/2025	26/7/2025
5	26/1/2025	1/2/2025	31	27/7/2025	2/8/2025
6	2/2/2025	8/2/2025	32	3/8/2025	9/8/2025
7	9/2/2025	15/2/2025	33	10/8/2025	16/8/2025
8	16/2/2025	22/2/2025	34	17/8/2025	23/8/2025
9	23/2/2025	1/3/2025	35	24/8/2025	30/8/2025
10	2/3/2025	8/3/2025	36	31/8/2025	6/9/2025
11	9/3/2025	15/3/2025	37	7/9/2025	13/9/2025
12	16/3/2025	22/3/2025	38	14/9/2025	20/9/2025
13	23/3/2025	29/3/2025	39	21/9/2025	27/9/2025
14	30/3/2025	5/4/2025	40	28/9/2025	4/10/2025
15	6/4/2025	12/4/2025	41	5/10/2025	11/10/2025
16	13/4/2025	19/4/2025	42	12/10/2025	18/10/2025
17	20/4/2025	26/4/2025	43	19/10/2025	25/10/2025
18	27/4/2025	3/5/2025	44	26/10/2025	1/11/2025
19	4/5/2025	10/5/2025	45	2/11/2025	8/11/2025
20	11/5/2025	17/5/2025	46	9/11/2025	15/11/2025
21	18/5/2025	24/5/2025	47	16/11/2025	22/11/2025
22	25/5/2025	31/5/2025	48	23/11/2025	29/11/2025
23	1/6/2025	7/6/2025	49	30/11/2025	6/12/2025
24	8/6/2025	14/6/2025	50	7/12/2025	13/12/2025
25	15/6/2025	21/6/2025	51	14/12/2025	20/12/2025
26	22/6/2025	28/6/2025	52	21/12/2025	27/12/2025
			53	28/12/2025	3/1/2026

<https://dgvs.mspbs.gov.py/calendario-epidemiologico/>

Boletín Epidemiológico Semanal
Semana Epidemiológica 38|2025
14 al 20 de setiembre del 2025

Responsables de contenido y edición.

Dra. Andrea Ojeda,
Dirección General de Vigilancia de la Salud
Dra. Esther Pedrozo,
Dirección del Centro Nacional de Información Epidemiológica y Vigilancia de Salud -DGVS

Equipo editor y diagramación.

Lic. Mónica Arellano
Lic. María Meza
Lic. Verónica Martínez
Lic. Fátima Aidée Vázquez
Lic. Ana Jara Notario
Lic. María José Duarte
Dr. Guido Zárate
Abril Lezcano

Equipo redactor por dirección y temas

Dirección de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles
Temas: Arbovirosis, Vectoriales, Zoonóticas Enfermedades Prevenibles por vacuna

Dra. Viviana De Egea
Lic. Martha Torales
Lic. Karina Rótela
Dr. Víctor Segovia
Lic. Edgar Sanabria
Lic. Lorena Romero
Lic. Luis Cousirat
Lic. Rossana Prado

Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública

Temas: Vigilancia de hospitalizados y fallecidos por Arbovirosis y COVID-19, Vigilancia Viruela Símica, Alertas Reglamento Sanitario Internacional.

Lic. Bettiana Martínez
Lic. Barbara Ortega
Dra. Malena Arce

Centro Nacional de Información Epidemiológica

Temas: Eventos ambientales, Situación Enfermedades de Notificación Obligatoria, Complicaciones Virus Zika, COVID-19, vigilancia de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) e Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), Meningoencefalitis.

Lic. Cynthia Viveros
Lic. Ana Jara
Dra. Katia Peralta
Lic. Mónica Arellano
Lic. María Meza
Lic. Elena Penayo
Dr. Daniel Fernández

