

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

Semana Epidemiológica 06 | 2026

08 al 14 de febrero



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL





CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
EVENTOS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA (ENO)	4
ENFERMEDAD TIPO INFLUENZA (ETI) E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS GRAVES (IRAG).....	5
COVID-19.....	12
VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES.....	16
CHIKUNGUNYA.....	18
OROPOUCHE Y MAYARO.....	21
SÍNDROME NEUROLÓGICO CON ASOCIACIÓN A VIRUS ZIKA	22
SÍNDROME CONGÉNITO/MICROCEFALIA ASOCIADA A VIRUS ZIKA	22
OTRAS ENFERMEDADES VECTORIALES	23
VIGILANCIA DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS	24
CASOS DE EXPOSICIÓN HUMANA A VIRUS RÁBICO.....	25
VIGILANCIA DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES POR VACUNA	27
MONITOREO DE LAS NOTIFICACIONES DE EVENTOS DE NOTIFICACIONES OBLIGATORIAS (ENO)	31
VIGILANCIA UNIVERSAL – MENINGOENCEFALITIS AGUDA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCCICA.....	35
VIGILANCIA DE MPOX	38
REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL.....	39
CALENDARIO DE SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS- AÑO 2026.....	40



INTRODUCCIÓN

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Paraguay tiene carácter universal, su población de estudio es toda persona que habita en el territorio nacional, y su alcance abarca los diferentes subsistemas de salud: privado, público, seguridad social, organizaciones no gubernamentales. Este sistema de vigilancia epidemiológica se sustenta por una red de vigilancia cuya organización central se encuentra representada por la Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS), dependiente del Viceministerio de Rectoría y Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

La Red de Vigilancia Nacional se organiza en tres niveles de gestión, el nivel nacional liderado por la DGVS, nivel regional que comprende a 18 Unidades Epidemiológicas Regionales, que a su vez abarcan a 1.500 unidades notificadoras actualmente. Toda la información de esta red de vigilancia es consolidada, analizada y presentada en este boletín epidemiológico que tiene una periodicidad semanal.

El Boletín Epidemiológico Semanal es el documento oficial de difusión de la DGVS, y comunica la situación de los eventos bajo vigilancia de notificación obligatoria, según el listado de la Resolución S.G. N.º 0057/2023. Su finalidad es difundir la situación epidemiológica del país, la ocurrencia de brotes y/o epidemias para una adecuada y oportuna toma de decisiones en prevención y control en salud pública.

La presentación de datos está organizada en apartados que incluyen un resumen de las enfermedades de notificación obligatoria a la semana epidemiológica correspondiente, enfermedades vectoriales, enfermedades respiratorias, zoonosis, enfermedades prevenibles por vacunación, así como eventos de salud pública de importancia nacional (ESPIN) y de importancia internacional (ESP II).

Los datos correspondientes al año 2025, están sujetos a modificaciones conforme se apliquen procesos de ajuste, validación o depuración técnica, en función a los procesos de cierre correspondiente.

EVENTOS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA (ENO)

Tabla 1. Comparativo de números de casos y tasas de incidencia acumulada de los eventos de notificación obligatoria (ENO) en Paraguay, con respecto al mismo período de los años 2024, 2025 y 2026 (SE 06)

Enfermedades de Notificación Obligatoria			Año 2024		Año 2025		Año 2026	
			N° de Casos Acum.	Tasa x 100.000 hab.	N° de Casos Acum.	Tasa x 100.000 hab.	N° de Casos Acum.	Tasa x 100.000 hab.
Vectoriales y Zoonóticas	Dengue		37.879	594,40	386	6,02	50	0,77
	Chikungunya		24	0,38	2	0,03	3	0,05
	Zika		0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Fiebre Amarilla		0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Leishmaniosis	Visceral	9	0,14	21	0,33	13	0,20
		Tegumentaria	2	0,03	5	0,08	6	0,09
	Chagas	Agudo	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		Crónico	3	0,05	12	0,19	9	0,14
	Paludismo	Autóctono	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		Importado	1	0,02	0	0,00	0	0,00
	Parálisis aguda flácida (PAF)*		3	0,19	3	0,19	6	0,38
	Poliomielitis		0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Sarampión		0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Rubeola		0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Tétanos Neonatal **		0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Tétanos otras edades (TOE)		2	0,03	0	0,00	0	0,00
	Tos Convulsa		0	0,00	17	0,26	6	0,09
	Parotiditis		49	0,77	0	0,00	40	0,62
	Varicela		140	2,20	0	0,00	174	2,69
	Difteria		0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedades Gastroentéricas	Enf. Transmit. por Alimentos		16	0,25	21	0,33	3	0,05
	Cólera		0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enf. Meningocócica	con MBA		1	0,02	2	0,03	3	0,05
	sin MBA		1	0,02	0	0,00	0	0,00
Otros eventos	Sx pulmonar por Hantavirus		1	0,02	1	0,02	0	0,00
	Intoxicación por Pesticidas		7	0,11	4	0,06	4	0,06
	Rabia Humana		0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Rabia Canina		1	0,02	0	0,00	0	0,00
	Accidentes Ponoñosos		276	4,33	302	4,71	134	2,07
	Fiebre Tifoidea		0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Sx. resp. agudo grave (SARS)		0	0,00	0	0,00	0	0,00
	SARS-CoV-2 (COVID-19)		7.668	120,33	959	14,94	698	10,80
	Peste		0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Brucelosis		0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Leptospirosis		1	0,02	0	0,00	0	0,00

Accidentes ponoñosos incluyen: Accidentes ofídicos, Escorpionismo y aracnoidismo

* Datos Obtenidos de la Vigilancia de PAF de Notificaciones por 100000 <15 años

**Tetanos Neonatal por 100000 nacidos vivos

Observación: Los datos obtenidos son sujetos a modificaciones

Fuente: VENOCD/DGVS

ENFERMEDAD TIPO INFLUENZA (ETI) E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS GRAVES (IRAG)

Resumen de situación de ETI e IRAG


Las consultas por Enfermedad Tipo Influenza (ETI) a nivel país, según reporte de la planilla semanal, se registran un descenso del 1% respecto a la semana anterior, por debajo del umbral de alerta. En la vigilancia centinela, los hospitalizados por Infecciones Respiratorias Agudas (IRAG) para la SE 06/2026, se registran 184 casos, y las proporciones acumuladas de ingreso a Unidades de Cuidados intensivo (UCI) y fallecidos son del 19% y 19% respectivamente. Los virus respiratorios identificados en la SE 06 circulan: Rhinovirus (16), Parainfluenza (5), Influenza A H3N2 (3), SARS-CoV-2 (2), Metapneumovirus (1). A continuación, se presentan los datos de la vigilancia universal a la SE 05, y los datos de la vigilancia centinela a la SE 06 del 2026 (datos parciales).

Vigilancia Universal de ETI

En la SE 04 del 2026, las notificaciones de Enfermedades de Tipo Influenza (ETI) acumulan 21.707 consultas ambulatorias. En la última semana (SE 05) se registraron 21.629 en las consultas de ETI, manteniéndose la curva de tendencia por debajo del umbral de alerta (Gráfico 1).


En la SE 05 del 2025, se observa un aumento para infección respiratoria aguda no neumonía (IRANN), IRAG y ETI en el grupo de los menores de 5 años. En el grupo de mayores de 5 años se observa un aumento para IRANN, ETI e IRAG (Gráfico 2 y 3).

Gráfico 1. Comparativo del número de consultas por ETI en la Vigilancia Universal, Paraguay, SE 05 del 2026 (comparativo 2018-2019, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026)




Fuente: Vigilancia de Enfermedades de Notificación Obligatoria-DGVS.

Gráfico 2. Tendencia de IRANN, ETI e IRAG por SE en <5 años en la Vigilancia Universal, Paraguay, Año 2024, 2025 y del 2026 (hasta SE 05)



Fuente: Planilla Semanal ENO, Vigilancia de Enfermedades de Notificación Obligatoria-DCNIE-DGVS.
Elaborado por: Programa de Vigilancia Especiales y Centinelas. DCNIE-DGVS.

Gráfico 3. Tendencia de IRANN, ETI e IRAG por SE en >5 años en la vigilancia universal, Paraguay, Año 2024, 2025 y del 2026 (hasta SE 05)




Fuente: Planilla Semanal ENO, Vigilancia de Enfermedades de Notificación Obligatoria-DCNIE-DGVS.
Elaborado por: Programa de Vigilancia Especiales y Centinelas, DNCIE-DGVS.

Vigilancia Centinela de IRAG

La Vigilancia Centinela de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), incluye el monitoreo y caracterización de casos hospitalizados en 10 centros centinelas (hospitales seleccionados), con el objetivo de conocer las características epidemiológicas, factores de riesgos y los agentes etiológicos de IRAG durante todo el año en Paraguay. Los datos a la SE 06 del 2026, son parciales sujetos a modificaciones.

Desde la SE 01 a la SE 06 del 2026, se registraron 1489 casos de IRAG (Gráfico 4). En la SE 06 del 2026, se registraron 184 hospitalizados por IRAG, el 39% (73/184) corresponde a edad pediátrica y 61% (111/184) en edad adulta.

Gráfico 4. Número de hospitalizados por IRAG según semana epidemiológica, Vigilancia Centinela, Paraguay, años 2024-2025 y 2026* (hasta 06/2026)



Elaborado por: Programa de Vigilancia Centinelas y Especiales-DCNIE-DGVS.


Tabla 2. Número de hospitalizados por IRAG según grupos de edad, Vigilancia Centinela, Paraguay, SE 06/2026

Grupo Etario	N° Hospitalizados	%
<2	30	17%
2 a 4	15	8%
5 a 19	28	18%
20 a 39	29	17%
40 a 59	22	10%
60 y más	60	30%
Total, general	184	100%

Elaborado por: Programa de Vigilancia Centinelas y Especiales-DCNIE-DGVS

En el comparativo con años anteriores, se registran aumento en las hospitalizaciones por IRAG en el grupo, en el grupo de, <2 años (Gráfico 5 y 6).


Gráfico 5. Casos hospitalizados por IRAG en edad pediátrica según semana epidemiológica, Vigilancia Centinela, Paraguay, años 2024- 2025 y 2026* (SE 06)



Fuente: Vigilancia Centinela IRAG/Vigilancias Especiales y Centinela (VE y C)-DGVS

Durante las últimas semanas del 2025 (SE52 y SE53) se observa disminución de casos; esto se debió a los días festivos y al feriado nacional que surgió del 25 al 26 de diciembre, que limitó la atención en los servicios de salud, respectivamente.


Gráfico 6. Casos hospitalizados por IRAG en edad adulta según semana epidemiológica, Vigilancia Centinela, Paraguay, años 2024- 2025 y 2026* (SE 06)



Fuente: Vigilancia Centinela IRAG/Vigilancias Especiales y Centinela (VE y C)-DGVS

En la SE 06 del 2026, se identificaron 34 hospitalizados por IRAG asociados a Virus respiratorios: Rhinovirus (16), Parainfluenza (5), Influenza A H3N2 (3), Sars-CoV-2 (2), Metapneumovirus (1) (Gráfico7).


Gráfico 7. Distribución de virus respiratorios identificados en casos hospitalizados por IRAG según semana epidemiológica, Vigilancia Centinela, Paraguay, años 2024-2025 y 2026* (SE 06)



Fuente: Laboratorio Central de Salud Pública (LCSP)/Laboratorios Centros Centinelas/Laboratorios Regionales.
Elaborado por: Programa de Vigilancia Centinelas y Especiales. DGVS.

Desde la SE 32/2025 se observa aumento en la circulación de SARS-CoV-2, comportamiento similar a años anteriores (Gráfico 8).


Gráfico 8. Distribución de virus respiratorios identificados en casos hospitalizados por IRAG, según semana epidemiológica, Vigilancia Centinela, Paraguay, años 2024-2025 y 2026 (SE 06)



Fuente: Laboratorio Central de Salud Pública (LCSP)/Laboratorios Centros Centinela/Laboratorios Regional.
Elaborado por: Programa de Vigilancia Centinela y Especiales. DGVS.

En la SE 06 se identificaron dos fallecidos asociados a virus respiratorios: Influenza B (1), Rhinovirus (1). (Gráfico 9).

Gráfico 9. Distribución de virus respiratorios identificados en casos fallecidos por IRAG según semana epidemiológica, Vigilancia Centinela, Paraguay, Año 2025 y (SE 06 del 2026)



Elaborado por: Programa de Vigilancia Centinela y Especiales. DGVS

Durante la temporada actual 2025, la actividad estuvo dominada por influenza A (H1N1), registrando picos históricos de hospitalizados y fallecidos por esta causa desde el año 2016 (Gráfico 10). Para el 2026 hasta la SE 06, se registraron 933 casos IRAG asociados a Influenza A (H1N1), con 19% en UCI y 6% fallecidos.

Más información disponible en: <https://sistemasdgvs.mspbs.gov.py/sistemas/irag/>

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY

PARAGUAY
TESAI HA TEKOPORAVE
NOTENDENHA

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y RESPUESTA A EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA

VEyC-DGVS
Vigilancia Especializada y Control

ALERTA EPIDEMIOLÓGICA N° 5

Fecha de emisión: 19 de diciembre del 2025
Semana Epidemiológica: 51


Responsables:

- Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública: Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional.
- Dirección del Centro Nacional de Información Epidemiológica: Programa de Vigilancia Especializada y Centinela, Virus Respiratorios.
- Dirección de Enfermedades Transmisibles: Programa Ampliado de Inmunizaciones/Programa Nacional de Prevención, Vigilancia y Control de Infecciones Hospitalarias.

IDENTIFICACIÓN DE INFLUENZA A (H3N2) SUBCLADO K Y RIESGO DE TRANSMISIÓN FUERA DEL PERIODO ESTACIONAL

Documento disponible en: https://dgvs.mspbs.gov.py/wp-content/uploads/2025/12/05-AlertaEpidemiologica-N%C2%B05-Virus-respiratorio-H3N2_subclado-K_final.pdf

Situación de influenza, SARS-CoV-2 y VSR, SE 02/2026



Disponible en: <https://www.paho.org/en/topics/influenza-sars-cov-2-rsv-and-other-respiratory-viruses/influenza-situation-region-americas>

ACTUALIZACIÓN SOBRE LA CIRCULACIÓN DE VARIANTES DE INFLUENZA A H3N2 EN PARAGUAY

La circulación histórica del virus Influenza A subtipo H3N2 en Paraguay se ha caracterizado por un patrón estacional, con predominio durante los meses de invierno. Los años en los que se documentó una mayor actividad de este subtipo fueron 2017, 2018, 2022 y 2024. Durante la temporada estacional del 2025 se ha observado predominio de Influenza A (H1N1). En las últimas semanas del 2025, la vigilancia virológica ha identificado circulación de Influenza A (H3N2) y Co-circulación de: Rhinovirus, Influenza B y SARS-CoV-2.

Contexto internacional

El 4 de diciembre del 2025, la OPS/OMS se emitió la primera Alerta en el hemisferio norte por la propagación de Influenza A (H3N2) subclado K, destacando el riesgo de transmisión fuera del periodo estacional. Posteriormente, el 11 de diciembre del 2025, la OPS/OMS publicó una nota informativa con directrices regionales, ante el riesgo de transmisión global y los cambios genéticos significativos respecto al subclado previo J.2.4.

Documento disponible en: <https://www.paho.org/es/documentos/nota-informativa-influenza-ah3n2-subclado-k-j241-consideraciones-para-region-americas-11>

Contexto nacional

El 19 de diciembre del 2025, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) a través de la Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS) emitió la Alerta Epidemiológica N.º 5 tras la identificación de influenza A (H3N2) Subclado K (J.2.4.1) en un brote asociado a viajeros. Este hallazgo representa un riesgo de transmisión fuera del periodo estacional, con implicancias para todo el país. La alerta se instruyó a todas las dependencias a implementar las siguientes directrices relacionadas a:

- Comunicación de Riesgo
- Vigilancia Epidemiológica
- Servicios de Salud
- Laboratorios

Documento disponible en: https://dgvs.mspbs.gov.py/wp-content/uploads/2025/12/05-AlertaEpidemiologica-N%C2%B05-Virus-respiratorio-H3N2_subclado-K_final.pdf

Monitoreo Nacional – Influenza A (H3N2) Subclado K

Paraguay continúa monitoreando la circulación de Influenza A (H3N2) subclado K mediante vigilancia centinela, vigilancia universal y análisis de conglomerados de casos respiratorios.

Recomendaciones para la población

Las medidas de protección se mantienen vigentes y son fundamentales para reducir la transmisión de virus respiratorios:

- Lavado frecuente de manos con agua y jabón.
- Distanciamiento físico y etiqueta respiratoria (cubrirse al toser o estornudar).
- Uso de tapabocas en presencia de síntomas respiratorios.
- Consulta médica oportuna y reposo según indicación profesional.
- Desinfección de superficies de alto contacto.
- Mantener higiene y ventilación en hogares, lugares de trabajo y espacios públicos.

COVID-19

En Paraguay, la vigilancia de COVID-19 aún se mantiene como vigilancia universal, además de la incorporación vigilancia centinela de ETI /IRAG y vigilancia genómica en hospitales centinelas. Este informe descriptivo, incluye las detecciones de SARS-CoV-2 a la SE 06 del 2026, notificadas al sistema RESPIRATORIO V2-DGVS, MSPBS.

Al evaluar los casos de COVID-19, desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad, se observa que ha disminuido a nivel nacional en comparación con años anteriores. Durante el año 2024 (SE 1 al 52) se registraron 16.316 casos de COVID-19, de los cuales 1.473 (9%) fueron hospitalizados y 123 fallecidos (TL=0,75%).

Durante el 2025 (SE 1 a SE 53), se registraron 11.540 casos confirmados, 1.372 (12,0%) hospitalizados y 60 (TL=0,5 %) fallecidos confirmados por COVID-19. La incidencia y mortalidad se mantienen en un nivel bajo. En lo que va del año 2026 (hasta la SE 06) registran un total de 696 casos confirmados, 94 hospitalizados y un fallecido (Tabla 3).

Tabla 3. Datos acumulados de casos, hospitalizados y fallecidos por COVID-19 en Paraguay, desde 2020 hasta la SE 06/2026*(14/02/2026)

Años	Casos confirmados	Hospitalizados	Fallecidos
2020	108.030	8.936	2.499
2021	364.681	39.593	14.377
2022	330.454	12.489	2.896
2023	22.359	2.307	323
2024	16.316	1.473	123
2025	11.540	1.372	60
2026	696	94	1

*datos parciales SE 06/ 2026

Fuente: Respiratorio V2-DGVS, MSPBS. Elaborado por Centro Nacional de Información Epidemiológica-DGVS.


Situación epidemiológica actual COVID-19

Durante las últimas semanas del 2025 (SE 52 y SE 53) se observa disminución de casos; esto se debió a los días festivos y al feriado nacional que surgió del 25 al 26 de diciembre, por tal efecto limitó la atención en los servicios de salud, respectivamente.

En lo que va del año 2026, SE 01 a SE 06, a nivel país se registraron 696 casos de COVID-19, con una tasa de incidencia acumulada (T.I.A.) de 11 casos por 100 mil habitantes. Se registran 14% hospitalizados todos en sala, se registra un fallecido (Tabla 4 y 5).

En la SE 06, se confirmaron 40 casos, de los cuales cuatro fueron hospitalizados, dos requirieron UCI (Tabla Gráfico 10).

Gráfico 10. Curva epidémica de casos COVID-19, según semana epidemiológica, Paraguay, SE 1 del 2025 hasta la SE 06/2026 (*Datos parciales)



Fuente: Respiratorio V2-DGVS, MSPBS. Elaborado por Centro Nacional de Información Epidemiológica-DGVS.

Tabla 4. Casos confirmados, hospitalizados y fallecidos COVID-19, según departamento de procedencia, Paraguay, SE 01 al SE 06 del 2026

Departamento	Casos confirmados	Hospitalizados	Fallecidos	Tasa de incidencia*	Proporción de hospitalizados	Tasa de mortalidad*	Tasa de letalidad (%)
Concepción	14	1	0	6	7	0,0	0
San Pedro	2	0	0	1	0	0,0	0,0
Cordillera	11	1	0	4	9	0,0	0,0
Guairá	38	2	0	21	5	0,0	0,0
Caaguazú	38	5	1	8	13	0,2	2,6
Caazapá	1	1	0	1	0	0,0	0,0
Itapúa	72	13	0	15	18	0,0	0,0
Misiones	3	1	0	3	0	0,0	0,0
Paraguarí	23	7	0	11	30	0,0	0,0
Alto Paraná	22	6	0	3	27	0,0	0,0
Central	244	36	0	12	15	0,0	0,0
Ñeembucú	21	1	0	27	5	0,0	0,0
Amambay	35	9	0	20	26	0,0	0,0
Canindeyú	13	0	0	6	0	0,0	0,0
Pte. Hayes	8	1	0	6	13	0,0	0,0
Boquerón	11	0	0	13	0	0,0	0,0
Alto Paraguay	1	1	0	5	0	0,0	0,0
Asunción	139	9	0	300	6	0,0	0,0
TOTAL	696	94	1	11	14	0,0	0,1

* por 100.000 habitantes

*Para el cálculo de las tasas se utilizó la población para el año 2026, según el Censo Nacional de Población y Viviendas del año 2022
Fuente: Respiratorio V2-DGVS, MSPBS. Elaborado por Centro Nacional de Información Epidemiológica-DGVS.

Tabla 5. Casos confirmados, Hospitalizados y fallecidos COVID-19, por grupos de edad, Paraguay, SE 01-SE 06 del 2026

GRUPO DE EDAD	Casos confirmados	Hospitalizados	Fallecidos	Tasa de incidencia*	Proporción de hospitalizados	Tasa de mortalidad*	Tasa de letalidad (%)
0 a 4	104	22	0	21	21	0,0	0,0
5 a 9	53	7	0	10	13	0,0	0,0
10 a 14	30	3	0	5	10	0,0	0,0
15 a 19	16	1	0	3	6	0,0	0,0
20 a 24	45	0	0	8	0	0,0	0,0
25 a 29	58	3	0	11	5	0,0	0,0
30 a 34	58	5	0	11	9	0,0	0,0
35 a 39	58	3	0	12	5	0,0	0,0
40 a 44	39	1	0	9	3	0,0	0,0
45 a 49	26	2	0	7	8	0,0	0,0
50 a 54	32	3	0	10	9	0,0	0,0
55 a 59	24	3	0	8	13	0,0	0,0
60 a 64	36	6	0	14	17	0,0	0,0
65 a 69	38	7	0	18	18	0,0	0,0
70 a 74	19	4	0	13	21	0,0	0,0
75 a 79	27	11	0	26	41	0,0	0,0
80 y +	33	13	1	29	39	0,9	3,0
TOTAL	696	94	1	11	14	0,0	0,1

* por 100.000 habitantes

*Para el cálculo de las tasas se utilizó la población para el año 2026 según el Censo Nacional de Población y Viviendas del año 2022. INE.
Fuente: Respiratorio V2-DGVS, MSPBS. Elaborado por Centro Nacional de Información Epidemiológica-DGVS.


Más detalles, disponible en: <https://dgvs.mspbs.gov.py/reporte-covid-19/>

VIGILANCIA GENOMICA

Actualización sobre circulación de variantes SARS COV-2 en Paraguay

Desde julio/2025, se observa una predominancia del recombinante XFG en las muestras analizadas a nivel nacional, correspondiente a la variante actualmente bajo vigilancia¹. Para identificar y rastrear las variantes del SARS-CoV-2, el sistema nacional de vigilancia genómica, coordinado por el LCSP, con la participación del Laboratorio Epidemiológico Regional de Alto Paraná (LERAP). De noviembre/2025 a enero/2026, 32 muestras en el LCSP y de agosto a diciembre/2025, 12 muestras en el LERAP para la secuenciación de SARS-CoV-2, siguiendo directrices de la OMS, que se enfoca en la vigilancia del comportamiento genético del virus para la búsqueda de nuevas mutaciones que pueden evolucionar con el tiempo (Gráfico 11).

Gráfico 11. Prevalencia de linajes de Ómicron. Los linajes señalados con la letra X engloba a variantes del mismo sublinaje



Fuente: Base de datos del Laboratorio Central de Salud Pública (LCSP)

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos por el LCSP y el LERAP en el presente informe confirman la permanencia de predominancia del clado XFG y sus linajes en las muestras analizadas hasta la fecha. A partir de septiembre se detecta el linaje QF.2 y posteriormente en octubre se detecta sublinajes del XFG. Las muestras secuenciadas del 2026 indican circulación simultanea de sublinajes derivadas del XFG. Además, se detectaron recombinantes como XFC y XFV en agosto y octubre del 2025, las cuales surge a partir del linaje: JN.1, un ancestro común del clado XFG predominante actualmente.

Fuente: Informe de Vigilancia Genómica, Laboratorio Central de Salud pública -MSPBS.

Fuente: 1 - WHO TAG-VE Risk Evaluation for SARS-CoV-2 Variant Under Monitoring: XFG. Junio 2025 <https://share.google/plnzKxQOdYv7QaL8k>.

VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES

DENGUE

Para el análisis de la información se aplicaron las definiciones de caso establecidas en el Protocolo de Vigilancia en Salud Pública del evento Arbovirosis, conforme a lo dispuesto en la Resolución SG N.º 0335/2023, disponible en el sitio oficial de la Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS) del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social:

<https://dgvs.mspbs.gov.py/wpcontent/uploads/2023/10/RESOLUCION-SG.-N%C2%B0-0335-2023.pdf>.

Este marco normativo garantiza la estandarización de criterios para la identificación, notificación y clasificación de los casos, asegurando la comparabilidad de los datos y la validez epidemiológica de los resultados presentados.

Definiciones utilizadas para los siguientes cálculos

Tasa de incidencia acumulada: $\text{casos sospechosos} + \text{confirmados} + \text{probables de dengue} / \text{población} \times 100.000 \text{ habitantes}$.

Cálculo de letalidad: $\text{número de fallecidos confirmados de dengue} / \text{número de casos confirmados de dengue} \times 100$.


Cálculo de mortalidad: $\text{número de fallecidos por dengue} / \text{Población total} \times 100.000 \text{ habitantes}$.

Periodo actual de monitoreo 2025/2026

Desde la SE 29 del 2024 y la SE 06/2026 a nivel país se registraron un total de 85.836 notificaciones.


El periodo de monitoreo actual incluye desde la SE 29 del 2024 a la SE 06 del 2026 se han registrado 23.475 notificaciones (Gráfico 12). Entre la SE 01 a la SE 06/2026 fueron notificados 5.922 de los cuales 47 fueron confirmados (44 confirmados por laboratorio y 3 probables) y 3.274 sospechosos, alcanzando una incidencia acumulada de 52 notificaciones por 100.000 habitantes. El 95,4% de las notificaciones fueron dengue sin signos de alarmas. Se ha confirmado la circulación de los serotipos DEN-1 (Tabla 6).

Gráfico 12. Curva de notificaciones de dengue, Paraguay, desde SE 29/2024 a SE 06/2026



Fuente: Vigilancia de Enfermedades Vectoriales y Zoonóticas, DGVS-MSPBS.

Tabla 6. Resumen período actual, Paraguay, SE 01 a la SE 06/2026



Fuente: Vigilancia de Enfermedades Vectoriales y Zoonóticas, DGVS-MSPBS

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes: casos sospechosos + confirmados + probables de dengue/población x 100.000 habitantes.

Durante el periodo de monitoreo, el departamento con mayor número de notificaciones es Central, pero la incidencia de notificaciones más elevadas se registra en Asunción (557 por 100 mil hab.) seguida por Alto Paraguay (371 por 100 mil hab.), Guairá (2600 por 100 mil hab.) (Tabla 7).

Tabla 7. Número de casos (confirmados, probables y sospechosos) y tasas de incidencias acumuladas de dengue por departamento, Paraguay, 2025-2026*

Departamento de residencia	N° de casos	Tasa de incidencia acumulada por 100.000 habitantes
Concepción	324	150
San Pedro	591	158
Cordillera	521	185
Guairá	490	260
Caaguazú	343	78
Caazapá	133	91
Itapúa	931	197
Misiones	173	148
Paraguarí	486	231
Alto Paraná	530	66
Central	4.570	231
Ñeembucú	130	161
Amambay	236	125
Canindeyú	258	129
Presidente Hayes	298	230
Boquerón	118	159
Alto Paraguay	67	371
Asunción	2.706	557
Total	12.905	201

Fuente: Vigilancia de Enfermedades Vectoriales y Zoonóticas, DGVS-MSPBS

Resumen últimas tres semanas, SE 04 a la SE 06/2026

Ingresaron en promedio de 488 notificaciones por semana (excluido descartados), se ha registrado 30 casos confirmados de dengue en las últimas 3 semanas. La tasa de incidencia es de 23 casos/100.000 habitantes (Tabla 8).

Tabla 8. Resumen últimas 3 semanas, Paraguay, SE 04 a la SE 06/2026

CIERRE DE CASOS	SE 04	SE 05	SE 06	ÚLTIMAS 3 SE	%
CONFIRMADO	6	14	10	30	1,2%
PROBABLE	0	0	0	0	0,0%
SOSPECHOSO	469	502	461	1.432	58,4%
DESCARTADO	424	389	175	988	40,3%
NOTIFICACIONES	899	905	646	2.450	100%


Fuente: Vigilancia de Enfermedades Vectoriales y Zoonóticas, DGVS-MSPBS.

CHIKUNGUNYA

Periodo actual de monitoreo 2025/2026

Desde la SE 29/2025 a la SE 06/2026 se han registrado seis casos para Chikungunya, de los cuales fueron confirmados (4 confirmados + 2 probables) a nivel país. De los cuales tres son del sexo femenino y tres del sexo masculino, todos adultos (Gráfico 13).

Gráfico 13. Casos de Chikungunya, Paraguay, según semana de inicio de síntomas y clasificación final, periodo 2025* (SE 29/2025 a SE 06/2026)



Fuente: Vigilancia de Enfermedades Vectoriales y Zoonóticas, DGVS-MSPBS



Mortalidad por Arbovirosis

Año 2024 - SE 1 a la SE 52

Se registraron en total 135 defunciones confirmadas por dengue y 1.144 descartados. No se registraron fallecidos por Zika ni Chikungunya.

Año 2025 acumulado desde la SE 01 a la SE 53

Se registra un fallecido en la semana 14 del 2025, cerrado por Comité Nacional, no hay casos en estudio, ni se han confirmado fallecidos en este periodo.

Año 2026 - SE 01 a la SE 06

No se registran fallecidos por Zika ni Chikungunya.

Fuente: Vigilancia de mortalidad ViMo-VRESP, DGVS.

Más detalles, disponible en: https://dgvs.mspbs.gov.py/sala_situaciones_arbovirosis




ALERTA EPIDEMIOLÓGICA CHIKUNGUNYA

Entre finales del 2025 e inicios del 2026, se ha observado un aumento sostenido de casos de Chikungunya en países y territorios de la Región de las Américas, así como la reanudación de la transmisión autóctona en áreas que no registraban la circulación del virus desde hace varios años. Si bien la dinámica observada puede corresponder a patrones epidemiológicos esperados en contextos con presencia del vector, la reaparición de casos en determinados territorios refuerza la necesidad de mantener una vigilancia sensible y una respuesta oportuna. En este contexto, la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) insta a los Estados Miembros a intensificar la vigilancia epidemiológica y de laboratorio, asegurar la detección temprana y el manejo clínico adecuado de los casos y consolidar las acciones integradas de control vectorial, a fin de limitar la transmisión y reducir la morbilidad y mortalidad asociadas.

CHIKUNGUNYA EN LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS

Desde finales del 2025 (SE 49) e inicios del 2026 (SE 4), se ha observado un aumento sostenido de casos de Chikungunya en países y territorios de la Región de las Américas, así como la reanudación de la transmisión autóctona en áreas que no registraban la circulación del virus desde hace varios años. En este periodo, se documentó una circulación importante en las regiones centro-oeste y sudeste de Brasil, Sur de Bolivia y la reaparición de casos en la zona del Escudo Guayanés. En el 2026 hasta la SE 4, se notificaron a través de PLISA 7.150 casos de Chikungunya, de los cuales 2.351 fueron confirmados, incluyendo una defunción (3). Figura 1. Distribución de casos de Chikungunya por año y semana epidemiológica en la Región de las Américas, 2022 – 2026.

Figura 1. Distribución de casos de chikungunya por año y semana epidemiológica en la Región de las Américas, 2022 – 2026.



Fuente: Adaptado de Organización Panamericana de la Salud. PLISA Plataforma de Información de Salud para las Américas, Portal de Indicadores de Chikungunya. Washington, D.C.: OPS/OMS; 2026 [Consultado el 5 de febrero del 2026].


Más detalles, disponible en: <https://www.paho.org/es/documentos/alerta-epidemiologica-chikungunya-10-febrero-2026>

OROPOUCHE Y MAYARO

El 13 de diciembre del 2024, la Organización Panamericana de la salud (OPS) emitió una Alerta Epidemiológica de Oropouche en la Región de las Américas.

A nivel país, desde la SE 1/2025 hasta la SE 06 del 2026, se han procesado 4.226 muestras para Oropouche y Mayaro, todas con resultado de RT-PCR negativo para ambos virus (Tabla 9) (Gráfico 14).

Gráfico 14. Número de muestras procesadas para Oropouche y Mayaro, según semana de inicio de síntomas y clasificación final, periodo 2025-2026* (SE 01 a SE 06/2026)



Fuente: Vigilancia de Enfermedades Vectoriales y Zoonóticas, DGVS, MSPBS.

Tabla 9. Número de muestras procesadas para Oropouche y Mayaro, periodo 2024-2025* (SE 01 a SE 06/2026)


Departamento de procedencia	N° MUESTRAS PROCESADAS	%
Concepción	17	0,41
San Pedro	35	0,8
Cordillera	89	1,88
Guairá	11	0,27
Caaguazú	15	0,34
Caazapá	15	0,36
Itapúa	65	1,50
Misiones	2	0,05
Paraguarí	48	1,16
Alto Paraná	183	4,41
Central	2.199	52,27
Ñeembucú	72	1,71
Amambay	32	0,77
Canindeyú	50	1,21
Pte. Hayes	301	7,04
Boquerón	101	2,39
Alto Paraguay	19	0,43
Asunción	971	22,96
Extranjero	1	0,03
TOTAL	4.226	100%

Fuente: Vigilancia de Enfermedades Vectoriales y Zoonóticas, DGVS, MSPBS.

SÍNDROME NEUROLÓGICO CON ASOCIACIÓN A VIRUS ZIKA

En Paraguay, desde la SE 1 hasta la SE 6 del año 2026, ingresaron al sistema de vigilancia 13 notificaciones de síndrome neurológico asociado a virus Zika, procedentes del departamento de Central, Itapúa, Asunción, Caaguazú, Paraguari y San Pedro. Con predominio del sexo femenino seis casos. Como diagnóstico de ingreso predomina el síndrome Guillain Barre 73%. De acuerdo a la clasificación según asociación al virus Zika, seis casos descartados y cinco se encuentran en estudio para el cierre de casos (Gráfico 15).

Gráfico 15. Notificaciones de Síndromes neurológicos asociados a virus Zika, según clasificación final, Paraguay, SE 1 a SE 53 hasta la SE 6/2026



Fuente: Centro Nacional de Información Epidemiológica, DGVS

SÍNDROME CONGÉNITO/MICROCEFALIA ASOCIADA A VIRUS ZIKA

Desde la SE 1 al 6 del año 2026, ingresaron al sistema de vigilancia dos notificaciones de sospecha de Síndrome Congénito/Microcefalia asociado a virus Zika, procedentes del departamento de Central y Concepción que corresponde al sexo femenino y masculino. De acuerdo a la clasificación según asociación al virus Zika, un caso descartado y un caso sospechoso pendientes de cierre epidemiológico.

OTRAS ENFERMEDADES VECTORIALES

Leishmaniasis visceral. Se reportan hasta la SE 06/2026, se registran 13 casos confirmados provenientes de los departamentos de Central (8), San Pedro (2), Paraguari (1), Amambay (1) y Presidente Hayes (1). De los casos confirmados, se registraron en el sexo masculino con una mediana de edad de 38 años y rango entre 2 a 72 años.

Leishmaniasis tegumentaria. Durante la SE 06/2026, se registran seis casos confirmados provenientes de los departamentos Central (3), San Pedro (1), Canindeyú (1) e Itapúa (1). De los casos confirmados, se registraron en el sexo masculino con una mediana de edad de 27 años.

Enfermedad de Chagas. Se reportan hasta la SE 06/2026, nueve casos confirmados crónicos de enfermedad de Chagas, con afectación equitativa en ambos sexos, provenientes de los siguientes departamentos: Central (6), Paraguari (1), Misiones (1) y Asunción (1).

Malaria. No se reportan casos hasta la SE 06/2026.

Fiebre amarilla. No se reportan casos en lo que va el año hasta la SE 06/2026.

Tabla 10. Casos de Leishmaniasis visceral, L. tegumentaria, Chagas agudo, Chagas crónico, malaria y fiebre amarilla según departamentos, Paraguay, SE 01 al SE 06 del 2026

Departamentos	Leishmaniasis visceral	Leishmaniasis tegumentaria	Chagas Agudo	Chagas Crónico	Malaria	Fiebre Amarilla
Concepción	0	0	0	0	0	0
San Pedro	2	1	0	0	0	0
Cordillera	0	0	0	0	0	0
Guairá	0	0	0	0	0	0
Caaguazú	0	0	0	0	0	0
Caazapá	0	0	0	0	0	0
Itapúa	0	1	0	0	0	0
Misiones	0	0	0	1	0	0
Paraguari	1	0	0	1	0	0
Alto Paraná	0	0	0	0	0	0
Central	8	3	0	6	0	0
Ñeembucú	0	0	0	0	0	0
Amambay	1	0	0	0	0	0
Canindeyú	0	1	0	0	0	0
Pte. Hayes	1	0	0	0	0	0
Boquerón	0	0	0	0	0	0
Alto Paraguay	0	0	0	0	0	0
Asunción	0	0	0	0	0	0
Extranjero	0	0	0	1	0	0
Sin Datos	0	0	0	0	0	0
Total	13	6	0	9	0	0

Fuente: Programa Nacional de Enfermedades Vectoriales, DGVS-MSPBS

VIGILANCIA DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS

Leptospirosis. No se reportan casos confirmados en la SE 06/2026.

Accidentes ponzoñosos. Para la SE 06 del 2026, los reportes fueron de 89 casos de Escorpionismo distribuidos en Central (45), Asunción (18), Itapúa (16), Canindeyú (4), Concepción (2), Alto Paraná (2), Cordillera (1) y Pte. Hayes (1). Las notificaciones de Aracnoidismo fueron 22 casos, en Central (12), Asunción (5), Itapúa (4), y Paraguarí (1). Las notificaciones por accidente ofídico 17 casos, en Itapúa (7), Amambay (3), Pte. Hayes (2), Caazapá (1), Alto Paraguay (1), Misiones (1), Paraguarí (1) y Canindeyú (1).

Brucelosis. En la SE 06/2026, no se reportaron casos.

Rabia humana. Hasta la SE 05/2026, no se registran casos de rabia en humanos.

Hantavirus. Hasta la SE 06 del año 2026 no se confirmaron casos de hantavirus.

Tabla 11. Resumen de enfermedades zoonóticas, Paraguay, SE 01 a 06 del 2026

Departamento	Accidente Ofídico	Escorpionismo	Aracnoidismo	Brucelosis	Rabia humana
Concepción	0	2	0	0	0
San Pedro	0	0	0	0	0
Cordillera	0	1	0	0	0
Guairá	0	0	0	0	0
Caaguazú	0	0	0	0	0
Caazapá	1	0	0	0	0
Itapúa	7	16	4	0	0
Misiones	1	0	0	0	0
Paraguarí	1	0	1	0	0
Alto Paraná	0	2	0	0	0
Central	0	45	12	0	0
Ñeembucú	0	0	0	0	0
Amambay	3	0	0	0	0
Canindeyú	1	4	0	0	0
Pdte. Hayes	2	1	0	0	0
Boquerón	0	0	0	0	0
Alto Paraguay	1	0	0	0	0
Asunción	0	18	5	0	0
SD	0	0	0	0	0
Total	17	89	22	0	0

Fuente: PNCZ y CAN-DGVS.

CASOS DE EXPOSICIÓN HUMANA A VIRUS RÁBICO

En la SE 06 del 2026, se notificaron 1.710 casos de exposición humana a virus rábico, la mayoría de las consultas corresponden al departamento Central (31%), seguida del Centro Antirrábico Nacional (22%) y Asunción (13%) (Tabla 12).

Tabla 12. Casos de exposición humana a virus rábico reportados al Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional, según Regiones Sanitarias, SE 06 del 2026

Departamentos	Número	%
Concepción	15	1%
San Pedro	13	1%
Cordillera	52	3%
Guairá	23	1%
Caaguazú	33	2%
Caazapá	3	0%
Itapúa	154	9%
Misiones	26	2%
Paraguarí	142	8%
Alto Paraná	50	3%
Central	536	31%
Ñeembucú	34	2%
Amambay	1	0%
Canindeyú	11	1%
Presidente Hayes	8	0%
Boquerón	0	0%
Alto Paraguay	0	0%
Asunción	230	13%
Centro Antirrábico Nacional	379	22%
TOTAL	1710	100%

Fuente: PNCZ y CAN-DGVS

De las personas afectadas, son del sexo femenino (47%) y sexo masculino (53%), y según grupos de edad, la mayoría tenían entre 20 a 39 años (27%) y 5 a 14 años (22%). Según la especie animal, predomina el perro (79%) y en menor medida el gato (12%) entre otros animales. En el 87% la exposición fue por mordeduras. Según los tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional, se registran que el 100% se realizó post exposición.

En el laboratorio del Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional (PNCZyCAN), para la SE 06/2026 fueron 85 muestras recibidas para diagnóstico de rabia animal, de las cuales fueron de especie canina (81), quiróptera (2), felino (1) y roedor (1). En el departamento Central (78) muestras y en Asunción (7) muestras, todos negativos.

A la fecha, se han confirmado ocho casos positivos de rabia animal procedentes del departamento de Concepción, San Pedro, Caaguazú, Paraguarí y Canindeyú, detectados en los laboratorios de referencia (tabla 13).

Tabla 13. Investigaciones e Intervenciones realizadas en relación a focos de rabia animal, Paraguay, acumulado, SE 06/2026

CASOS	DEPARTAMENTO	DISTRITO	ESPECIES	CONTACTO (Personas)	DOSIS APLICADAS	TOTAL, DE VACUNAS UTILIZADAS (Personas)
1	Caaguazú	Vaquería	BOVINA	8	6	18
2	Paraguarí	Pirayú	BOVINA	4	4	12
3	San Pedro	San Pedro	BOVINA	3	4	12
4	Canindeyú	Nueva Esperanza	BOVINA	4	4	16
5	Paraguarí	Pirayú	BOVINA	4	4	16
6	Concepción	Concepción	BOVINA	5	4	20
7	Concepción	Concepción	EQUINA	5	4	20
8	Central	Ypacaraí	BOVINA	2	4	8
TOTAL, GENERAL				35	34	122

Mapa 1. Casos de rabia animal en Paraguay, SE 06 del 2026



Fuente: Departamento de Epidemiología - PNCZYCAN



VIGILANCIA DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES POR VACUNA

Desde la SE 06 del 2026 en el país, **no se han confirmado ningún caso** de: rubéola, síndrome de rubéola congénita, poliomiелitis, difteria y tétanos neonatal.

Casos acumulados a la semana 06

Vigilancia de las Parálisis Flácidas Agudas en ≤ 15 años (PFA) para poliomiелitis: En la SE 06 se han notificado seis casos sospechosos con pendientes de resultados laboratoriales. Los casos notificados de la Séptima Región Sanitaria-Itapúa no presentan nexos epidemiológicos entre sí, son casos aislados

Vigilancia de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) para sarampión/rubéola: Hasta la SE 06, se han notificado 169 casos sospechosos de sarampión y rubéola; de los cuales 139 (82%) fueron descartados por laboratorio y/o criterio clínico epidemiológico.

Síndrome de Rubeola Congénita (SRC): En la SE 06 no se notificaron casos.

Difteria: En la SE 06 cero casos notificados.

Coqueluche: En la SE 06 se reportaron 27 casos sospechosos, de los cuales seis han sido confirmados mediante análisis de laboratorio. Así mismo, 19 fueron descartados y dos pendientes de resultados laboratoriales. Entre los confirmados se registran tres casos menores de un año y tres de un año de edad. Residentes en el departamento Central y Alto Paraná.

Parotiditis: En la SE 06 se han notificado 40 casos confirmados por clínica.

Tétanos Neonatal (TNN): En la SE 06 cero casos notificados.

Tétanos en Otras Edades (TOE): En la SE 06 cero casos notificados.

Varicela: Hasta la SE 06 se han notificado 174 casos confirmados por clínica. Actualmente se cuenta con tres brotes institucionales activos en el departamento de Itapúa, Amambay y Capital.

Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI): En la SE 06 se notificaron 27 casos de ESAVI por vacunas del esquema regular, el 81% (22) de los casos se encuentran clasificados como No Graves. No se incluyen ESAVI por vacuna COVID 19.



Tabla 14. Notificación de casos sospechosos de enfermedades prevenibles por Vacunación y ESAVI, por regiones sanitarias, Paraguay, SE 06/2026

REGION SANITARIA	PFA			EFE**			SRC			DIFTERIA			COQUELUCE			PAROTIDITIS		TNN			TOE			VARICELA		ESAVI
	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Conf.	
Concepción	...	...	...	3	2	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1	1	...	...	...	...	...	...	...	...	1
S. Pedro N.	...	...	...	1	1	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2
S. Pedro S.	1	0	0	1	0*	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5	5	..
Cordillera	...	...	...	14	13	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1	1	...	...	...	...	...	...	2	2	...
Guairá	...	...	...	3	3	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	8	8	...
Caaguazú	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1	1	0	...	...	...	...	...	...	...	...	3	3	...
Caazapá	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2	2	...
Itapúa	3	0	0	25	23	0	...	...	...	...	...	...	3	3	0	9	9	...	...	...	...	...	...	19	19	3
Misiones	...	...	...	2	2	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1	1	...	...	...	...	...	...	2	2	...
Paraguarí	...	...	...	8	7	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2	2	...	...	...	...	...	...	12	12	1
A. Paraná	...	...	...	5	3	0	...	...	...	...	...	...	2	1	1	4	4	...	...	...	...	...	...	7	7	4
Central	1	0	0	85	69	0	...	...	...	...	...	...	10	5	4	16	16	...	...	...	...	...	...	87	87	9
Ñeembucú	...	...	...	2	1	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3	3	...
Amambay	...	...	...	4	3	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1	1	...	...	...	...	...	...	6	6	...
Canindeyú	...	...	...	2	2	0	...	...	...	...	...	...	1	1	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Pdte. Hayes	...	...	...	6	4	0	...	...	...	...	...	...	10	8	1	...	...	...	...	...	...	...	...	3	3	1
Boquerón	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
A. Paraguay	...	...	...	2	2	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2	2	...
Asunción	1	0	0	6	4	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5	5	...	...	...	...	...	...	13	13	6
Total, País	6	0	0	169	139	0	...	...	...	...	...	...	27	19	6	40	40	...	...	...	...	...	...	174	174	27

Notif.: Casos sospechosos notificados de la SE 6 - 2026. ... No se notificó casos sospechosos

Fuente: Programa Ampliado de Inmunizaciones

En la tabla 15, se presentan los indicadores de vigilancia del sarampión/rubéola y de la poliomielitis; el porcentaje mínimo requerido es de 80% por indicador.

Indicador de unidades que notifican semanalmente: En la SE 06, el país cuenta con 1.500 unidades notificadoras; con un cumplimiento del 98%.

Se recuerda a las regiones realizar el control de calidad de las notificaciones; debe coincidir el número de casos notificados en la planilla de Enfermedad de Notificación Obligatoria con el número de casos notificados por ficha epidemiológica individual.

Indicadores de Vigilancia del Sarampión/Rubéola: En la SE 06, el país cumple con los indicadores de investigación y muestras adecuadas, además los envíos se realizan dentro de los cinco días al laboratorio nacional.

Indicadores de Vigilancia de la PFA para Poliomielitis: En la SE 06, el país cumple con los indicadores de investigaciones y muestras adecuadas.

Tabla 15. Indicadores de Vigilancia comparativo entre 2025 y 2026, Paraguay SE 06 del 2026

		SARAMPIÓN / RUBÉOLA												POLIOMIELITIS							
REGION SANITARIA	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Casos con muest adec		%Muest lleg. Al lab ≤ 5 días		% Resul lab ≤4 días		Tasa*		% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Muest. Adec		Tasa**		
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	
Concepción S. Pedro N S. Pedro S Cordillera Guairá Caaguazú Caazapá Itapúa Misiones Paraguarí A. Paraná Central Ñeembucú Amambay Canindeyú Pdte. Hayes Boquerón A. Paraguay Asunción	100	96	100	100	100	100	100	100	100	100	0.47	1.21	100	100	0	0	0	0	0.00	0	
	100	98	0	100	0	100	0	100	0	100	0.00	0.43	100	98	0	100	0	100	0.00	0	
	88	98	100	100	100	0	100	0	100	0	0.56	0.49	88	98	0	100	0	100	0.00	2.17	
	97	100	100	93	100	100	100	100	88	100	2.87	5.36	97	100	0	0	0	0	0.00	0	
	95	100	100	67	50	100	0	66	100	100	1.08	1.77	95	100	0	0	0	0	0.00	0	
	94	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0.23	0.00	94	0	0	0	0	0	0.00	0	
	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	97	0	0	0	0	0	0.00	0	
	97	100	100	92	100	100	73	100	100	100	3.35	5.76	97	100	0	100	0	100	0.00	2.66	
	97	95	0	50	0	100	0	100	0	100	0.00	1.79	97	98	0	0	0	0	0.00	0	
	100	100	100	100	100	100	81	87	78	100	5.40	4.89	100	100	0	0	0	0	0.00	0	
	99	97	86	80	100	100	71	60	100	100	0.87	0.60	99	98	100	0	100	0	0.46	0	
	100	100	66	81	89	93	90	93	93	100	1.82	4.36	100	100	100	100	100	100	0.21	0.22	
	97	100	67	100	67	100	50	50	50	100	3.48	4.04	97	100	0	0	0	0	0.00	0	
	100	100	100	75	100	100	100	100	100	100	0.57	2.31	100	100	0	0	0	0	0.00	0	
	96	93	100	100	100	100	0	100	0	100	0.52	0.88	96	90	0	0	0	0	0.00	0	
97	100	100	67	100	83	100	100	100	100	3.85	4.18	97	100	0	0	0	0	0.00	0		
93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	93	0	100	0	100	0	4.44	0		
100	100	0	100	0	50	0	100	0	100	0.00	9.17	100	100	0	0	0	0	0.00	0		
100	98	100	100	100	100	100	100	75	100	1.62	1.44	100	98	0	100	0	100	0.00	0.92		
Total, País	98	98	86	85	94	95	84	93	90	100	1.58	2.63	98	98	100	100	100	100	0.19	0.38	

*Cumplimiento de tasa de EFE
** Cumplimiento de tasa de PFA

El último caso de Rubéola fue en el 2005 y de SRC en 2003
Último caso registrado de Poliomielitis en 1985.

Fuente: Programa Ampliado de Inmunizaciones

RECORDATORIO

Vigilancia de la PFA: en caso de muestra inadecuada (muestra de heces recolectada posterior a los 14 días de la parálisis del caso), se debe recolectar muestra de heces a tres o cinco contactos menores de 5 años de edad. Estos pueden ser vecinos, familiares, amigos, compañeros de juegos, etc., en la brevedad posible, la muestra se debe enviar en un frasco estéril de tapa rosca, 8 gr de heces, tamaño de 2 pulgares, sin nada de conservantes (un frasco por cada muestra), adjuntar carnet de vacunación, ficha de PFA, mencionando que es contacto del caso, con la fecha de toma de muestra y refrigerar a +2+8 °C y enviar las muestras con la ficha PFA completa al LCSP en un plazo no mayor a dos días de su recolección, avisar al PAI nacional de su envío al LCSP. La investigación de las EPV realizada dentro de las 48 hs de notificado el caso sospechoso es de suma importancia para evitar casos secundarios. Se recuerda a las Unidades Epidemiológica Regional realizar el control de calidad de las notificaciones; debe coincidir el número de casos notificados en la planilla de Enfermedad de Notificación Obligatoria con el número de casos notificados por ficha.

Mas información sobre sarampión disponible en: <https://dgvs.mspbs.gov.py/sarampion/>

ALERTA EPIDEMIOLÓGICA SARAMPIÓN EN LAS AMERICAS


El marcado incremento de casos de sarampión en la Región de las Américas durante 2025 y el inicio de 2026, constituye una señal de alerta que requiere una acción inmediata y coordinada por parte de los Estados Miembros. La Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) insta a los Estados Miembros a reforzar de manera prioritaria las actividades de vigilancia y vacunación de rutina, y asegurar una respuesta rápida y oportuna ante casos sospechosos. Asimismo, recomienda implementar búsquedas activas comunitarias, institucionales y de laboratorio para la identificación temprana de casos, así como desarrollar actividades complementarias de vacunación destinadas a cerrar brechas de inmunidad.

Resumen de la situación en la Región de las Américas

En 2025, entre la semana epidemiológica (SE) 1 y la SE 53, en la Región de las Américas, fueron confirmados 14.891 casos de sarampión, incluyendo 29 defunciones, de las cuales 22 (73%) se han producido en población indígena (2). Los casos fueron notificados por Argentina (n= 36 casos), Belice (n= 44 casos), el Estado Plurinacional de Bolivia (n= 597 casos), Brasil (n= 38 casos), Canadá (n= 5.436 casos², incluyendo dos defunciones), Costa Rica (n= 1 caso), El Salvador (n= 1 caso), los Estados Unidos de América (n= 2.242 casos, incluyendo tres defunciones), Guatemala (n= 1 caso), México (n= 6.428 casos, incluyendo 24 defunciones), Paraguay (n= 49 casos), Perú (n= 5 casos) y Uruguay (n= 13 casos) (Figura 2) (3-21). Este total representa un aumento de 32 veces en contraste con los 466 casos de sarampión notificados en el 2024 (2). En comparación con el registro histórico de sarampión en la Región, el número de casos confirmados de sarampión en el año 2025 fue el más alto desde el 2019, siendo éste el año con mayor número de casos de los últimos 22 años (n= 23.269) (Figura 3) (22-23).

En 2026, entre la SE 1 y la SE 3, en la Región de las Américas, fueron confirmados 1.031 casos de sarampión, sin defunciones notificadas. Los casos fueron notificados por Bolivia (n= 10 casos), Canadá (n= 67 casos), Chile (n= 1 caso), los Estados Unidos de América (n= 171 casos), Guatemala (n= 41 casos), México (n= 740 casos) y Uruguay (n= 1 caso) (3- 21). Este total representa un aumento de 45 veces en comparación con los 23 casos de sarampión notificados en el mismo periodo del 2025 (2, 25).

Figura 2. Casos confirmados* de sarampión por semana epidemiológica de inicio de exantema o de notificación y país en la Región de las Américas, 2025- 2026 (hasta la SE 3 del 2026).



*Nota: Incluye casos confirmados y probables para Canadá.

Fuente: Adaptado de datos aportados por los respectivos países (3-21).


Disponible en: https://www.paho.org/sites/default/files/2026/02/2026-feb-03-phe-alerta-epi-sarampion-esfinal_1.pdf

MONITOREO DE LAS NOTIFICACIONES DE EVENTOS DE NOTIFICACIONES OBLIGATORIAS (ENO)

Cumplimiento de notificación, es el indicador de la proporción de unidades que notifican semanalmente los eventos o enfermedades de notificación obligatoria (ENO) según Planilla Semanal, por regiones sanitarias.


En la SE 06 del 2026, el 98,8% (1.482/1.500) de unidades o servicios de salud cumplieron con este indicador. (Gráfico 16 y Mapa 2).

Gráfico 16. Porcentaje de cumplimiento de las Unidades Notificadoras de Planilla Semanal de ENO según Regiones Sanitarias, Paraguay, SE 06 del 2026



Fuente: VENOCD-DGVS

Mapa 2. Cumplimiento de las Unidades Notificantes de Planilla Semanal de ENO según Regiones Sanitarias, Paraguay, SE 06 del 2026




Fuente: VENOCD-DGVS

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA

Según datos provenientes de la notificación semanal de Eventos de Notificación Obligatoria (ENO), durante la SE 06/2026 se registraron 5.277 casos de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) a nivel nacional. La tendencia observada se encuentra en la franja de alerta (Tabla 16) (Gráfico 17).

Gráfico 17. Canal endémico de EDA en población total según semana epidemiológica, Paraguay, SE 06 del 2026



Fuente: Planilla Semanal De Enfermedades O Eventos De Notificación Obligatoria (PSENO).

Tabla 16. Casos Enfermedades Tipo Influenza por Regiones Sanitarias, últimas ocho semanas, Paraguay SE 52/2025 a SE 06/2026


Región Sanitaria	SE 52	SE 53	SE 01	SE 02	SE 03	SE 04	SE 05	SE 06	Variación últimas 2 semanas (%)
CONCEPCION	108	161	259	226	150	137	221	173	-22
SAN PEDRO NORTE	70	102	124	89	99	86	103	74	-28
SAN PEDRO SUR	67	76	83	81	83	87	81	73	-10
CORDILLERA	91	124	147	133	124	121	113	134	19
GUAIRA	129	226	180	207	130	147	127	128	1
CAAGUAZU	117	174	227	170	135	129	144	136	-6
CAAZAPA	79	109	111	99	78	85	86	54	-37
ITAPUA	450	486	508	522	468	484	513	470	-8
MISIONES	97	136	108	105	121	111	133	108	-19
PARAGUARI	68	143	130	157	141	122	125	125	0
ALTO PARANA	224	341	449	454	489	387	449	439	-2
CENTRAL	1298	1755	1654	1975	2119	1826	1588	1536	-3
ÑEEMBUCU	29	73	89	93	129	63	61	65	7
AMAMBAY	36	55	53	76	69	81	60	55	-8
CANINDEYU	66	75	116	113	145	150	127	111	-13
PTE. HAYES	120	171	153	199	155	175	161	176	9
BOQUERON	86	95	135	120	86	104	94	120	28
ALTO PARAGUAY	24	34	30	39	34	30	20	27	35
CAPITAL	973	1415	1493	1488	1533	1439	1436	1273	-11
TOTAL PAIS	4132	5751	6049	6346	6288	5764	5642	5277	-6
VARIACION PORCENTUAL	-20	39	5	5	-1	-8	-2	-6	

Fuente: Planilla Semanal De Enfermedades O Eventos De Notificación Obligatoria (PSENO).

CONJUNTIVITIS

Durante la SE 06/2026 se registraron 141 casos, con un aumento del 14% con respecto a la semana anterior (SE 05) (Gráfico 17).

Gráfico 17. Tendencia de casos de conjuntivitis según semana epidemiológica, Paraguay, años 2021 a SE 06 del 2026



Fuente: VENOCD-DGVS


VIGILANCIA UNIVERSAL - MENINGOENCEFALITIS AGUDA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCCICA

Resumen 2025. Se registraron 576 notificaciones, de los cuales se han clasificado como Meningitis el 72% (n=417), siendo más frecuentes las compatibles con etiología viral (n=178) seguida de la bacteriana (n=174) casos. Entre los agentes virales el más frecuente fue el Enterovirus (25%), seguido por Virus Herpes Humano 6 o 7 enterovirus (25%). En cuanto a la etiología bacteriana, el más frecuentemente fue con *Streptococcus pneumoniae* (17%), *Neisseria meningitidis* (16%) y *Haemophilus influenzae* (9%)

SITUACIÓN 2026

Desde la SE 01 a SE 04 del 2026, se han registrado 32 notificaciones al Sistema de Vigilancia Universal de Meningoencefalitis Aguda. La curva de tendencia se mantiene por debajo del promedio de casos notificados teniendo en cuenta el mismo periodo del 2025, se observó un descenso que la situó por debajo del promedio de casos (Gráfico 18).

Gráfico 18. Casos sospechosos de Meningoencefalitis según semana epidemiológica, Vigilancia Universal, Paraguay, año 2024, 2025 y 2026(hasta la SE 04)*




* El promedio de casos esperados es de 12 casos semanales (calculado en base a los años sin brotes identificados).

Fuente: Programa de Vigilancia Especial y Centinela DGVS – MSPBS.

Según grupos etarios, se observa mayor frecuencia en los grupos menores de 2 años (16%), seguido del grupo de adultos de 50 a 59 años. En general, se observa predominio del sexo masculino (56%) (Gráfico 19).


Gráfico 19. Casos sospechosos de Meningoencefalitis según grupo de edad y sexo, Vigilancia Universal, Paraguay, SE 01 hasta la 04/2026



Fuente: Programa de Vigilancia Especial y Centinela DGVS – MSPBS.

Se han reportado notificaciones en nueve departamentos del país, siendo la mayoría de procedencia: Central 22% (7/32), Asunción 16% (5/32) e Itapúa 16% (5/32) (Gráfico 20).


Gráfico 20. Casos sospechosos de Meningoencefalitis según departamento de procedencia, Vigilancia Universal, Paraguay, SE 01 al 04/2026



Fuente: Programa de Vigilancia Especial y Centinela DGVS – MSPBS.

Fueron descartados con otros diagnósticos nueve casos (28,1%). Reunieron criterios de Meningitis 21 casos (65,6%), siendo las de probable etiología bacteriana nueve casos (43%) y las compatibles con probable etiología viral 12 casos (57,2%).

Gráfico 21. Distribución de casos sospechosos de Meningoencefalitis y Enfermedad Meningocócica, según clasificación final, Vigilancia Universal, Paraguay, acumulado hasta SE 04/2026



*EM sin MBA: Enfermedad meningocócica sin meningitis bacteriana aguda
Fuente: Programa de Vigilancia Especial y Centinela DGVS – MSPBS.

Meningitis Bacteriana Aguda: Se notificaron nueve (28,1%) probables casos de Meningitis Bacteriana Aguda, fue posible la identificación del agente causal en seis casos (66,7%)

Tabla 17. Agentes causales identificados en Meningitis bacterianas. Vigilancia Universal, Paraguay, SE 01 al 04/2025

Agente causal identificado (n=115)	Frecuencia Absoluta (n)
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	1
<i>Staphylococcus aureus</i>	2
<i>Neisseria meningitidis</i> *	2
<i>Haemophilus influenzae</i> **	1

* *Neisseria meningitidis*: serogrupo C.

** *Haemophilus influenzae*: serotipo b

Fuente: Programa de Vigilancia Especial y Centinela DGVS – MSPBS.

Meningitis/Encefalitis Viral: Las Meningoencefalitis de probable etiología Viral notificadas fueron 12 casos (43%). Fue identificado el virus causal en seis casos (Tabla 18).

Tabla 18. Agentes causales identificados en Meningoencefalitis Virales. Vigilancia Universal, Paraguay, SE 01 al 04/2025

Agente causal identificado (n=98)	Frecuencia Absoluta (n)
Parvovirus B19	3
Virus Varicella Zoster (VZV)	2
Herpes Simplex tipo 1 y 2 (HSV-1 y 2)	1

Fuente: Programa de Vigilancia Especial y Centinela DGVS – MSPBS.

Mortalidad asociada a Meningitis/Encefalitis Viral: No se registran fallecidos.

VIGILANCIA DE MPOX

Antecedentes

El 23 de julio de 2022, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de viruela símica (Mpox) una Emergencia de Salud Pública de Importancia internacional (ESPII) a raíz del brote de multi países no endémicos de la enfermedad. El 11 de mayo del 2023 la OMS declara el fin de la emergencia por viruela símica después de una disminución sostenida de los casos a nivel mundial. Desde entonces esta enfermedad se vigila de manera rutinaria.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 14 de agosto de 2024 una nueva emergencia sanitaria mundial por el brote de viruela símica (Mpox). Esta decisión se basa en el aumento de casos en África, especialmente en la República Democrática del Congo, y la detección de una nueva variante. Alertó previamente sobre la circulación de esta nueva variante en la región, asociada a una mayor transmisión y casos en diversos grupos de edad, incluyendo niños.

Culminación de la ESPII relacionada con el aumento del Mpox 2024

El **5 de septiembre del 2025**, información relacionada a la culminación de la emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) en relación con el aumento del Mpox en 2024 se compartió con los CNE para el RSI. a decisión de terminación se tomó después de la quinta reunión del Comité de Emergencia del RSI sobre el aumento del Mpox en 2024, celebrada el 4 de septiembre del 2025.

Situación actual 2026

Hasta la SE 06 del corriente año, se han reportado tres (3) notificaciones al sistema de vigilancia. Todas las muestras procesadas arrojaron resultados negativos, resultando en la clasificación de descartados mediante diagnóstico laboratorial.

La distribución geográfica de las **notificaciones descartadas** comprende los departamentos de Central (1), Asunción (1) y San Pedro (1). A la fecha, el país no registra sospechosos ni casos confirmados.

Clasificación	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Año 2025	Año 2026*	Totales
Confirmados	53	73	0	5	0	131
Descartados	142	125	66	22	3	358

*Datos parciales a la SE 05/2026

La información de la Vigilancia relacionada a Mpox se actualiza una vez por semana y se encuentra disponible en el siguiente enlace: <https://dgvs.mspbs.gov.py/monkeypoxparaguay/>.



REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL

El Centro Nacional de Enlace (CNE) para el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) es el punto de contacto designado por cada Estado Parte para asegurar una comunicación constante (24/7/365) con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Su función principal es facilitar el intercambio de información sobre eventos de salud pública y posibles amenazas.

En Paraguay, el CNE para el RSI opera desde 2006 en la Dirección General de Vigilancia de la Salud, específicamente con el equipo operativo de la Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. La comunicación continua se mantiene a través de diversas vías, incluyendo portales de sitios públicos:

PAHO - CORREOS DESDE EL PUNTO FOCAL, ALERTAS, NOTAS TECNICAS, ACTUALIZACIONES

1. **Actualización en el Sitio de Brotes Epidémicos - Mpox: virus recombinante con elementos genómicos de los clados Ib y IIb:**

En los últimos meses se ha documentado la recombinación de cepas del virus de la viruela del simio (MPXV), con dos casos reportados de una cepa recombinante que comprende los clados Ib y IIb de MPXV.

El primer caso se detectó en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante, "Reino Unido"), con antecedentes de viajes a un país del Sudeste Asiático, y el segundo en la India, con antecedentes de viajes a un país de la Península Arábiga.}

<https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2026-DON595>.



CALENDARIO DE SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS- AÑO 2026

Mes	N° de Semana	Desde	Hasta	Mes	N° de Semana	Desde	Hasta
ENE 2026	1	04/01	10/01	JUL 2026	26	28/06	04/07
	2	11/01	17/01		27	05/07	11/07
	3	18/01	24/01		28	12/07	18/07
	4	25/01	31/01		29	19/07	25/07
FEB 2026	5	01/02	07/02		30	26/07	01/08
	6	08/02	14/02	AGO 2026	31	02/08	08/08
	7	15/02	21/02		32	09/08	15/08
	8	22/02	28/02		33	16/08	22/08
MAR 2026	9	01/03	07/03		34	23/08	29/08
	10	08/03	14/03	SEP 2026	35	30/08	05/09
	11	15/03	21/03		36	06/09	12/09
	12	22/03	28/03		37	13/09	19/09
ABR 2026	13	29/03	04/04		38	20/09	26/09
	14	05/04	11/04		39	27/09	03/10
	15	12/04	18/04	OCT 2026	40	04/10	10/10
	16	19/04	25/04		41	11/10	17/10
	17	26/04	02/05		42	18/10	24/10
MAY 2026	18	03/05	09/05		43	25/10	31/10
	19	10/05	16/05	NOV 2026	44	01/11	07/11
	20	17/05	23/05		45	08/11	14/11
	21	24/05	30/05		46	15/11	21/11
JUN 2026	22	31/05	06/06		47	22/11	28/11
	23	07/06	13/06	DIC 2026	48	29/11	05/12
	24	14/06	20/06		49	06/12	12/12
	25	21/06	27/06		50	13/12	19/12
					51	20/12	26/12
					52	27/12	02/01

<https://dgvs.mspbs.gov.py/calendario-epidemiologico/>



Boletín Epidemiológico Semanal

Semana Epidemiológica 6|2026

08 al 14 de febrero del 2026

Responsables de contenido y edición.

Dra. Andrea Ojeda,

Dirección General de Vigilancia de la Salud

Dra. Esther Pedrozo,

Dirección del Centro Nacional de Información Epidemiológica y Vigilancia de Salud -DGVS

Equipo editor y diagramación.

Lic. Mónica Arellano

Lic. María Meza

Lic. Verónica Martínez

Lic. Fátima Aidée Vázquez

Lic. Ana Jara Notario

Lic. María José Duarte

Dr. Guido Zárate

Lic. Abril Lezcano

Equipo redactor por dirección y temas

Dirección de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles

Temas: Arbovirosis, Vectoriales, Zoonóticas Enfermedades Prevenibles por vacuna

Dra. Viviana De Egea

Lic. Martha Torales

Lic. Karina Rótela

Dr. Víctor Segovia

Lic. Edgar Sanabria

Lic. Lorena Romero

Lic. Luis Cousirat

Lic. Rossana Prado

Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública

Temas: Vigilancia de hospitalizados y fallecidos por Arbovirosis y COVID-19, Vigilancia Viruela Símica, Alertas Reglamento Sanitario Internacional.

Lic. Bettiana Martínez

Lic. Barbara Ortega

Dra. Malena Arce

Centro Nacional de Información Epidemiológica

Temas: Eventos ambientales, Situación Enfermedades de Notificación Obligatoria, Complicaciones Virus Zika, COVID-19, vigilancia de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) e Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), Meningoencefalitis.

Lic. Cynthia Viveros

Lic. Ana Jara

Dra. Katia Peralta

Lic. Mónica Arellano

Lic. María Meza

Lic. Elena Penayo



Dirección General de Vigilancia de la Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
<https://dgvs.mspbs.gov.py/>



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL**

